herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Traszka szorstkoskóra

Taricha granulosa

Taricha granulosa to traszka o długości 13-22 cm z pacyficznego wybrzeża Ameryki Północnej, z ciemnym, ziarnistym grzbietem i jaskrawopomarańczowym brzuchem. Skóra zawiera tetrodotoksynę, jedną z najsilniejszych trucizn wśród płazów, a zwierzę jest śmiertelnie toksyczne, jeśli zostanie połknięte. Gatunek przechodzi między wodą a lądem, może być trzymany w wodzie przez cały rok i wymaga chłodnych warunków.

Rodzina: Salamandridae Nazwa angielska: Rough-skinned Newt Dawna nazwa: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans*

Silne toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-22 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**12-18 lat**
Aktywność	**Za dnia i w nocy**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Silne** Unikaj kontaktu ze skórą i dokładnie umyj ręce po pracy w terrarium
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-21 °C**
Temperatura w nocy	**14-18 °C**
Wilgotność	**80-95%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 20-30 cm
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, gotowa karma i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**48-60 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**7-30**
Czas do wyklucia	**21-42 dni**
Okres larwalny	**60-150 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Taricha granulosa* to najbardziej wodny gatunek w rodzaju. Zwierzęta przechodzą między lądem a wodą, niektóre na całe miesiące lub lata, ale od mniej więcej pierwszego roku życia można je trzymać w wodzie przez cały rok.
TEMPERATURA	*Taricha granulosa* to gatunek ciepłolubny w odwrotnym sensie: lubi chłód. Latem woda i powietrze powinny mieć 18-21 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Część lądowa i kryjówki nad wodą powinny być wilgotne, ale nie mokre. Wilgotności powietrza nie mierzono dla tego gatunku; akwaterrarium z pokrywą i wilgotnymi kryjówkami daje około 80-95 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda powinna mieć 20-30 cm głębokości, a głębsza nie szkodzi: w zwykłym akwarium praktycznie nie da się zapewnić temu gatunkowi zbyt głębokiej wody.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek nie potrzebuje UVB. Wystarczy zwykłe światło dzienne w pomieszczeniu albo słaba świetlówka w dzień i ciemność w nocy. Akwarium nie może stać w bezpośrednim słońcu, a lamp grzewczych należy unikać.
ŻYWIENIE	*Taricha granulosa* to oportunistyczny drapieżnik. W naturze zjada kiełże, owady, ślimaki, pijawki, kijanki oraz skrzek płazów i ikrę ryb.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Aktywność bywa różna: niektóre zwierzęta są aktywne w dzień, inne kryją się pod korzeniami i kamieniami i polują nocą. W okresie godowym samiec obejmuje samicę w ampleksusie, który może trwać od kilku godzin do kilku dni.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone i Kanada.