herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Traszka alpejska

Triturus carnifex

Triturus carnifex to masywna traszka grzebieniasta o długości 12-18 cm z Włoch, południowych Alp i północno-zachodnich Bałkanów. Ma brodawkowatą, ciemną skórę, żółty lub pomarańczowy brzuch z dużymi, rozmytymi czarnymi plamami, a samica często ma żółty pasek wzdłuż grzbietu. Wiosną u samca wyrasta wysoki, ząbkowany grzebień. Gatunek jest odporny, łatwy w utrzymaniu i rozmnażaniu.

Rodzina: Salamandridae Nazwa angielska: Italian Crested Newt Dawna nazwa: *Salamandra carnifex; Salamandra platycauda*

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-18 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**7-17 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**12-20 °C**
Temperatura w nocy	**8-15 °C**
Wilgotność	**70-95%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 15-30 cm
Temperatura wody	**10-20 °C**
UVB	**Niewymagane**
Zimowanie	**4-10 °C** 6-12 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**12-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**150-400**
Czas do wyklucia	**14-35 dni**
Okres larwalny	**56-112 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma, inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Triturus carnifex* można trzymać zgodnie z naturalnym cyklem, z fazą wodną i lądową, albo przez cały rok w wodzie.
TEMPERATURA	*Triturus carnifex* lubi chłód. Woda powinna mieć poniżej 25 °C, bo w cieplejszej zwierzęta próbują ją opuścić. Zwierzęta są w pełni aktywne do około 10 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	W fazie wodnej wilgotność nie stanowi problemu. W fazie lądowej delikatna skóra szybko wysycha, dlatego podłoże musi być wilgotne, a wilgotność powietrza wynosić 70-95 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Głębokość wody 15 cm wystarcza, a głębsza też jest w porządku: 15-30 cm daje zwierzętom miejsce do pływania. Wodę utrzymuje się w temperaturze 10-20 °C.
OŚWIETLENIE I UVB	Zwierzęta są aktywne nocą i same nie potrzebują UVB ani sztucznego światła. Rośliny potrzebują światła do wzrostu i wystarczy zwykła lampa akwariowa.
ŻYWIENIE	W fazie wodnej *T. carnifex* przyjmuje szeroki wybór pokarmu: dżdżownice, kiełże (*Gammarus*), larwy komarów, rozwielitki i białe robaki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Triturus carnifex* jest odporny i łatwy w utrzymaniu. W wodzie zwierzęta energicznie chwytają wszystko, co się rusza, także siebie nawzajem podczas karmienia, a w naturze zjadają również mniejsze płazy.
NATURALNY ZASIĘG	Włochy, Szwajcaria, Austria, Słowenia, Chorwacja i Bośnia i Hercegowina.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/triturus-carnifex