herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Black Knobby Newt

Tylototriton asperrimus

Tylototriton asperrimus to ciemny, brodawkowaty traszkowiec o długości 12-15 cm, z guzowatymi wyrostkami żeber i masywnymi grzebieniami grzbietowymi. Gatunek zamieszkuje wilgotne tereny górskie w chińskiej prowincji Kuangsi i dał nazwę całej grupie blisko spokrewnionych traszkowców, które dopiero niedawno wyodrębniono jako osobne gatunki.

Rodzina: Salamandridae Dawna nazwa: *Echinotriton asperrimus; Pleurodeles asperrimus* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-15 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las górski i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Część wodna** głębokość 1-5 cm
UVB	**Opcjonalne**
Zimowanie	**8-12 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**30-80**
Czas do wyklucia	**20-36 dni** przy 22-24 °C
Okres larwalny	**50-110 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Tylototriton asperrimus* jest skąpa.
TEMPERATURA	Latem utrzymuj w terrarium 20-24 °C w dzień i 18-21 °C w nocy, co odpowiada latu w obszarze występowania.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza wynosi 80-100 %. Terrarium zraszaj codziennie spryskiwaczem do kwiatów; muszą w nim być zarówno wilgotniejsze, jak i suchsze strefy, a powietrze nie może stać w miejscu.
WODA I JAKOŚĆ WODY	W części wodnej powinna być miękka, lekko kwaśna woda; odpowiednia jest deszczówka lub woda z odwróconej osmozy. pH wody nie jest udokumentowane dla *Tylototriton asperrimus*; *Tylototriton ziegleri* trzymany jest przy pH 6,4-6,8.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło nie ma dla zwierząt szczególnego znaczenia i dobiera się je pod kątem roślin: taśmy LED lub świetlówki przez 12 godzin latem i 10-11 godzin zimą. UVB nie jest potrzebne temu skrycie żyjącemu gatunkowi.
ŻYWIENIE	Dorosłe osobniki dostają czerwie, świerszcze, świerszcze domowe, larwy barciaka, dżdżownice i równonogi odpowiedniej wielkości mniej więcej dwa razy w tygodniu. Zimą jedzą nieregularnie i znacznie mniej.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	U blisko spokrewnionych gatunków zwierzęta prowadzą bardzo skryty tryb życia i widać je głównie podczas karmienia lub gdy samce przebywają w wodzie.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/tylototriton-asperrimus