herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Guizhou Crocodile Newt

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis to masywny, czarnobrązowy traszkowiec o długości 15-21 cm z trzema szerokimi pasami w kolorze od pomarańczowego do czerwonawego wzdłuż ciała. Żyje na lądzie w górach prowincji Kuejczou i Junnan, a do wody wchodzi głównie w celu rozrodu. Najlepiej trzymać go w dużym terrarium z częścią lądową i wodną.

Rodzina: Salamandridae Dawna nazwa: *Pleurodeles kweichowensis* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-21 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i półwodny**
Środowisko	**Las górski i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-25 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 10-15 cm
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na liściach nad wodą**
Liczba jaj w zniesieniu	**50-150**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**10-12 dni** przy 25 °C
Okres larwalny	**80-100 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Tylototriton kweichowensis* potrzebuje dużego terrarium, ponieważ zwierzęta są duże i ciężkie, wymagają solidnej części lądowej z kryjówką dla każdego osobnika i muszą mieć dość wody zarówno do rozrodu, jak i do zamontowania filtra.
TEMPERATURA	Gatunek dobrze czuje się w zwykłej temperaturze pokojowej: 18-25 °C w dzień i 15-20 °C w nocy. Latem temperatura dzienna może utrzymywać się w górnej części zakresu, a zimą przez całą dobę utrzymuje się 15-20 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna być wysoka, ale podłoże nie może być mokre; 70-90 % to wartość szacunkowa. Część lądową utrzymuje się wilgotną, ale nie błotnistą, a fragment podłoża może być suchszy.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Część wodna zajmuje mniej więcej połowę terrarium. Głębokość nie została udokumentowana dla tego gatunku; 10-15 cm to wartość zapożyczona od *Tylototriton verrucosus*.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest potrzebne, a gatunek jest najbardziej aktywny o zmierzchu i w nocy.
ŻYWIENIE	Dorosłe osobniki dostają pokrojone dżdżownice, świerszcze i inne ofiary odpowiedniej wielkości. Larwy barciaka i inne tłuste larwy są chętnie zjadane, ale nie powinny stanowić podstawy diety.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest powolny i niezdarny. 2-3 osobniki można trzymać razem, jeśli jest wystarczająco dużo kryjówek dla każdego z nich.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny.