herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Emperor Crocodile Newt

Tylototriton shanjing

Tylototriton shanjing to masywna, ciemnobrązowa traszka krokodyla z Junnanu w południowo-zachodnich Chinach o jaskrawopomarańczowej głowie, grzebieniu grzbietowym, brodawkach gruczołowych i ogonie. Osiąga 12-20 cm, niemal cały rok żyje na lądzie i wchodzi do wody tylko na czas rozrodu. Zwierzę jest spokojne i odporne, ale skóra wydziela toksyczną wydzielinę, więc po każdym kontakcie trzeba umyć ręce.

Rodzina: Salamandridae

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-20 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i półwodny**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**75 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-25 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**30-150**
Czas do wyklucia	**10-12 dni** przy 22-25 °C
Okres larwalny	**90-150 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Tylototriton shanjing* to traszka lądowa, która potrzebuje wody tylko w okresie rozrodu.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień wynosi 18-25 °C, a w nocy 15-20 °C. Latem w dzień może dochodzić do 24-26 °C. Zimą zwierzęta trzyma się chłodniej, w około 15-17 °C przez całą dobę, i na suchszym podłożu.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Gatunek preferuje stosunkowo suche warunki, suchsze niż inne lądowe traszki krokodyle. 60-80 % wilgotności powietrza to wartość szacunkowa.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Poza okresem rozrodu wodę stanowi płytka miska o pochyłych ściankach z odchlorowaną wodą z kranu, regularnie wymienianą. W okresie rozrodu potrzebna jest większa część wodna, co najmniej 30 × 30 cm (zob. "Gody").
OŚWIETLENIE I UVB	*Tylototriton shanjing* jest aktywny o zmierzchu i w nocy i prowadzi skryty tryb życia, więc rzadko wychodzi przy zapalonym świetle. UVB nie jest potrzebne. Światło służy roślinom; wystarczy żarówka LED, która prawie nie grzeje.
ŻYWIENIE	Dżdżownice są najlepszym pokarmem podstawowym; duże dżdżownice kroi się na odpowiednie kawałki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Zwierzę jest spokojne i powolne i może stać się bardzo oswojone: wiele osobników żebrze o jedzenie przy szybie, gdy przyzwyczai się do opiekuna. Mimo to nie jest to zwierzę do codziennego brania na ręce.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/tylototriton-shanjing