herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Himalayan Crocodile Newt

Tylototriton verrucosus

Tylototriton verrucosus to duża, ciemnobrązowa traszka z rodzaju krokodylich traszek, pochodząca z gór zachodniego Junnanu, północnej Mjanmy i sąsiednich regionów. Osiąga 13-24 cm i jest najbardziej związana z wodą spośród krokodylich traszek trzymanych w terrariach: w ciepłej porze roku często przebywa wyłącznie w wodzie, gdzie jest aktywna i ciekawska.

Rodzina: Salamandridae Dawna nazwa: *Pleurodeles verrucosus; Triturus verrucosus* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-24 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**12-18 g**
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Las górski i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-25 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 12-15 cm
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**12-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**30-200**
Czas do wyklucia	**10-12 dni** przy 25 °C
Okres larwalny	**90-150 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Tylototriton verrucosus* najlepiej trzymać w akwaterrarium. Powyżej około 18 °C formę ciemną można trzymać wyłącznie w wodzie.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 18-25 °C, latem około 25 °C, a nocą 15-20 °C. Zimą zwierzęta trzyma się w 15-18 °C. Forma ciemna znosi bez szkody przez kilka dni zarówno wyższe, jak i niższe temperatury.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza nie ma kluczowego znaczenia w zbiorniku z dużą ilością wody; 70-90 % to wartość orientacyjna. Tam, gdzie jest ląd, utrzymuj go wilgotnym, ale nie błotnistym. Zadbaj o to, by powietrze nie stało w miejscu.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Głębokość wody wynosi 12-15 cm. Wymieniaj 20-30 % wody co dwa tygodnie, a częściej, jeśli zostaje dużo resztek pokarmu. Wodę z kranu przed użyciem uzdatnia się preparatem neutralizującym chlor, chloraminę i metale ciężkie.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny o zmierzchu i nocą, a UVB nie jest potrzebne. Długość dnia około 12 godzin latem to dobry, choć niekonieczny rytm, a poza tym oświetlenie ma po prostu odpowiadać roślinom. Unikaj bezpośredniego słońca.
ŻYWIENIE	Gatunek nie jest wybredny, a duże samice potrafią w krótkim czasie zjeść zdumiewająco dużo.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	W wodzie zwierzę jest aktywne i ciekawskie i może stać się dość oswojone: podpływa do szyby po jedzenie i bierze pokarm z pęsety i palców. Nie nadaje się jednak do codziennego brania do ręki.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny, Mjanma (Birma), Indie i Tajlandia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/tylototriton-verrucosus