herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Vietnam Crocodile Newt

Tylototriton vietnamensis

Tylototriton vietnamensis to mała, ciemna traszka krokodylowa o długości 12-17 cm, pochodząca z kilku resztek lasów w północnym Wietnamie. Zwierzę jest czarne do brunatnoszarego, z jaskrawożółtymi do pomarańczowoczerwonych palcami i spodem ogona, i żyje głównie na lądzie. Gatunek opisano dopiero w 2005 roku i w naturze jest narażony na wyginięcie.

Rodzina: Salamandridae

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-17 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**7-18 g**
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**23-25 °C**
Temperatura w nocy	**23-25 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Część wodna** głębokość 1-5 cm
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**18 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**5-178**
Zniesienia w roku	**1-2**
Czas do wyklucia	**28 dni** przy 22-24 °C
Okres larwalny	**60-180 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Tylototriton vietnamensis* trzyma się w terrarium typu lasu deszczowego z częścią wodną.
TEMPERATURA	Od marca do października terrarium utrzymuje się w temperaturze 23-25 °C przez całą dobę; odrębna temperatura nocna nie jest udokumentowana.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza w ciepłej części roku wynosi 70-100 %. Terrarium zrasza się codziennie spryskiwaczem do kwiatów lub instalacją deszczującą; ilość zależy od wielkości terrarium i wentylacji.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Część wodna ma 1-5 cm głębokości i zajmuje jedną czwartą powierzchni dna. Woda jest miękka i lekko kwaśna (pH 6,4-6,8), jak w naturze. Zawsze zapewnij łatwe wyjście z wody za pomocą kamieni, żwiru lub płaskiego brzegu.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło nie ma dla zwierząt szczególnego znaczenia i nie lubią one silnego oświetlenia. Oświetlenie można dostosować do roślin, stosując listwy LED lub świetlówki, albo poprzestać na świetle wpadającym do pomieszczenia.
ŻYWIENIE	Dorosłe zwierzęta dostają dżdżownice, świerszcze i larwy barciaka, a owady karmowe same są karmione urozmaiconą dietą i oprószane suplementem witaminowo-mineralnym.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Zwierzęta szukają kryjówek i nie lubią ostrego światła. W okresie rozrodu samce wchodzą do wody, jaśnieją, ich skóra wyraźnie się zmienia i czekają na samice. Przez resztę roku obie płcie żyją na lądzie.
NATURALNY ZASIĘG	Wietnam.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/tylototriton-vietnamensis