herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

## Wenxian Knobby Newt

# *Tylototriton wenxianensis*

*Tylototriton wenxianensis* to średniej wielkości, niemal całkowicie czarny traszkowiec krokodyli z pomarańczowymi końcówkami palców i krawędzią ogona. Żyje w ukryciu w lasach i zaroślach w górach środkowych Chin i wchodzi do wody wyłącznie w celu rozrodu; jaja składane są na lądzie. Wiedza o hodowli jest skąpa, dlatego ten poradnik opiera się na blisko spokrewnionych gatunkach.

Rodzina: Salamandridae

**Słabe toksyny skórne**

## NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **13-16 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **10-20 lat** |
| Aktywność | **O zmierzchu i w nocy** |
| Tryb życia | **Naziemny i półwodny** |
| Środowisko | **Las górski i mokradła** |
| Toksyny skórne | **Słabe**<br>Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust |
| Trudność | **Doświadczony** |

### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 40 × 40 cm**<br>D × S × W dla 3 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **18-24 °C** |
| Temperatura w nocy | **15-20 °C** |
| Wilgotność | **70-90%** |
| Woda | **Część wodna**<br>głębokość 3-5 cm |
| UVB | **Niewymagane** |
| Pokarm | **Owady i dżdżownice i ślimaki** |
| Utrzymanie | **W parach lub w grupach** |

### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Larwy w wodzie** |
| Miejsce składania jaj | **Na ziemi** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **30-80** |
| Czas do wyklucia | **20-36 dni**<br>przy 22-24 °C |
| Okres larwalny | **80-130 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)** |
| Opieka nad potomstwem | **Brak** |

### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Narażony (VU)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o hodowli *Tylototriton wenxianensis* jest skąpa. |
| **TEMPERATURA** | Latem terrarium utrzymuje się w temperaturze 22-24 °C w dzień, zimą około 18 °C, a nocą temperatura może spaść do 15-20 °C. Krótkotrwałe niższe temperatury nie szkodzą. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Latem terrarium zrasza się codziennie, tak aby mech i podłoże były wilgotne, a wilgotność powietrza wynosiła 70-90 %. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Woda jest miękka i lekko kwaśna, pH 6,4-6,8, i ma najwyżej około 5 cm głębokości. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | UVB nie jest konieczne. Gatunek żyje w ukryciu i nie lubi silnego światła; oświetlenie służy przede wszystkim roślinom. Zapewnij około 12 godzin światła latem i 10-11 godzin zimą. |
| **ŻYWIENIE** | Dieta tego gatunku nie została udokumentowana. Przedstawiciele rodzaju przyjmują typowy pokarm dla salamander: dżdżownice, świerszcze, prosionki i larwy barciaka. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Zwierzęta prowadzą bardzo skryty tryb życia i można je trzymać pojedynczo, w parach lub w małych grupach. Trzymaj gatunek osobno, bez innych płazów. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Chiny. |