herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Ziegler's Crocodile Newt

Tylototriton ziegleri

Tylototriton ziegleri to niewielka, niemal całkowicie czarna traszka krokodylowa o długości 13-16 cm, z trzema rzędami dużych brodawek wzdłuż grzbietu i jaskrawoczerwonymi palcami oraz spodem ogona. Gatunek opisano w 2013 roku. Żyje w ukryciu w lasach górskich północnego Wietnamu i południowych Chin i łatwo go utrzymać w terrarium z niewielką częścią wodną.

Rodzina: Salamandridae Dawna nazwa: *Yaotriton ziegleri* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-16 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**6-16 g**
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las górski**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-24 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Część wodna** głębokość 1-5 cm
UVB	**Opcjonalne**
Zimowanie	**16-18 °C** 12-17 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Liczba jaj w zniesieniu	**30-80**
Czas do wyklucia	**20-36 dni** przy 20-24 °C
Okres larwalny	**50-110 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Tylototriton ziegleri* utrzymuje się w terrarium typu lasu deszczowego z niewielką częścią wodną. Trzy dorosłe osobniki potrzebują terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	Od marca do października terrarium utrzymuje się w temperaturze 22-24 °C w dzień i 20-22 °C w nocy.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza wynosi 80-100 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	W części wodnej powinna być miękka, lekko kwaśna woda o pH 6,4-6,8, np. deszczówka, która postała przez jakiś czas. Woda ma głębokość najwyżej 5 cm. Nigdy nie używaj wody z kranu bez usunięcia chloru.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło nie ma dla zwierząt szczególnego znaczenia, a silnego światła nie lubią. Dobiera się je pod kątem roślin: taśmy LED lub świetlówki przez 12 godzin latem i 10-11 godzin zimą. Wystarczy też pośrednie światło w pomieszczeniu.
ŻYWIENIE	Dorosłe zwierzęta dostają pokarm typowy dla salamander: dendrobeny, świerszcze, świerszcze domowe, larwy barciaka, dżdżownice i równonogi o odpowiedniej wielkości.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Zwierzęta są skryte i spokojne i najczęściej widać je podczas karmienia albo gdy samce są w wodzie.
NATURALNY ZASIĘG	Wietnam i Chiny.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/tylototriton-ziegleri