herpy

SCYNKI

## Scynk salomoński

# *Corucia zebrata*

Największy scynk świata: spokojny, nadrzewny roślinożerca z Wysp Salomona z chwytnym ogonem, który działa jak piąta kończyna. *Corucia zebrata* żyje w grupach rodzinnych, rodzi duże, żywe młode i wymaga wysokiego, wilgotnego i dobrze wentylowanego terrarium oraz mnóstwa świeżych liści. Gatunek dla doświadczonego hodowcy obdarzonego cierpliwością.

Rodzina: Scincidae  Nazwa angielska: Monkey Skink

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **60-80 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Waga | **500-850 g** |
| Długość życia | **15-25 lat** |
| Aktywność | **O zmierzchu i w nocy** |
| Tryb życia | **Nadrzewny** |
| Środowisko | **Las deszczowy** |
| Trudność | **Doświadczony** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 60 × 120 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **24-28 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **29-31 °C** |
| Temperatura w nocy | **21-24 °C** |
| Wilgotność | **70-80%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Owoce i rośliny** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo, w parach lub w grupach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Żyworodny** |
| Wielkość miotu | **1-2 młodych** |
| Ciąża | **180-240 dni** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Bliski zagrożenia (NT)** |

## Hodowla w skrócie

**TERRARIUM**

Gatunek spędza całe życie na drzewach i potrzebuje wysokiego terrarium. Dorosły scynk powinien mieć co najmniej 120 × 60 × 120 cm (długość × szerokość × wysokość), a wysokość jest ważniejsza niż powierzchnia dna.

**TEMPERATURA**

Gatunek potrzebuje umiarkowanego ciepła. W dzień temperatura powinna wynosić 24-28 °C, a ciepłe miejsce wysoko w terrarium może osiągać 29-31 °C. W nocy może spaść do 21-24 °C.

**WILGOTNOŚĆ I WODA**

Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 %. Utrzymuje się ją, zraszając 2-3 razy dziennie lub stosując automatyczny system zraszania, wilgotne podłoże i żywe rośliny.

**OŚWIETLENIE I UVB**

Gatunek jest najbardziej aktywny o zmierzchu i można go utrzymywać bez UVB, jeśli D3 podaje się z pokarmem, ale zalecane jest słabe oświetlenie UVB.

**ŻYWIENIE**

*Corucia zebrata* jest roślinożercą i w naturze zjada liście, kwiaty, owoce i pędy wielu roślin, m.in. *Epipremnum*, które znosi mimo licznych kryształów szczawianu. Dieta musi być urozmaicona i świeża.

**ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM**

Gatunek porusza się spokojnie i rozważnie, rzadko ucieka. Gdy czuje się zagrożony, otwiera pyszczek i syczy, a dorosły scynk potrafi boleśnie ugryźć, przebijając skórę.

**NATURALNY ZASIĘG**

Wyspy Salomona i Papua-Nowa Gwinea.