herpy

SCYNKI

Peters' Banded Skink

Scincopus fasciatus

A heavy, nocturnal burrowing skink from the edges of the Sahara, yellow to orange with broad black crossbands. *Scincopus fasciatus* digs permanent burrows in sandy soil, eats insects and grows to 20-25 cm. It needs deep, sandy substrate, a warm basking spot, a dark hiding place and dry air.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Scincus fasciatus; Cyclodus brandtii*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-25 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia, półpustynia i sawanna**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-38 °C**
Temperatura w nocy	**20-25 °C**
Wilgotność	**20-45%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, owoce i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**4-5 jaj**
Inkubacja	**50-70 dni** przy 27-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Little is known about keeping *Scincopus fasciatus*, and the incubation and lifespan figures are borrowed from the related *Scincus scincus*. A single animal needs at least 90 × 45 × 45 cm (length × width × height).

TEMPERATURA

By day the air should be 27-30 °C, and under a heat lamp a hide or a flat stone should reach 35-38 °C measured with an infrared thermometer. Put a thermostat on the heating. At night the temperature should be 20-25 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Humidity should be low, 20-45 %, with good ventilation. Provide a damp hide on the cool side, where the substrate under a piece of bark or stone is kept moist; it helps during shedding.

OŚWIETLENIE I UVB

Scincopus fasciatus is nocturnal, but weak UVB (Ferguson zone 1) is recommended. Use a UVB tube in a reflector above the basking spot and let the animal withdraw into shade.

ŻYWIENIE

Scincopus fasciatus eats mostly insects such as cockroaches, crickets, mealworms, silkworms and black soldier fly larvae. A little greens and fruit can be offered as a supplement.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

The species is calm and tolerates handling, but is most active at night and spends the day underground. New animals are best left in peace for two to three weeks, until they eat steadily.

NATURALNY ZASIĘG

Maroko, Algieria, Tunezja, Sahara Zachodnia, Mauretania, Mali, Niger, Czad, Sudan, Sudan Południowy i Libia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/en/skinks/scincopus-fasciatus