herpy

SCYNKI

Blotched Blue-Tongued Lizard

Tiliqua nigrolutea

Tiliqua nigrolutea to masywny, ciężko zbudowany scynk z południowo-wschodniej Australii o szerokim niebieskim języku i jasnych, nieregularnych plamach na ciemnym grzbiecie. Jest aktywny w dzień i wszystkożerny, osiąga 35-50 cm długości i może żyć wiele lat. Gatunek pochodzi z chłodnego klimatu umiarkowanego z wyraźnym spoczynkiem zimowym i potrzebuje dużego terrarium, UVB oraz nocnego spadku temperatury.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Scincus nigroluteus; Cyclodus nigroluteus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**35-55 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-30 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las górski i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**37-40 °C**
Temperatura w nocy	**18-24 °C**
Wilgotność	**40-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Wielkość miotu	**5-11 młodych**
Ciąża	**90-150 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik III**
Załącznik unijny	**Załącznik C**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 180 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość), co odpowiada nieco ponad 1 m² powierzchni dna. Im większe, tym lepiej.

TEMPERATURA

Temperatura powietrza powinna wynosić 21-29 °C od chłodnej do ciepłej strony, a powierzchnia miejsca do wygrzewania 37-40 °C, tak aby zwierzę mogło utrzymywać preferowaną w czasie aktywności temperaturę ciała 30-35 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 40-50 %, mierzona po chłodnej stronie. Mokre podłoże nie jest potrzebne, ale kryjówka z wilgotnym torfowcem, w której wilgotność dochodzi do 100 %, pomaga przy linieniu.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje zarówno UVB, jak i mocnego światła. Użyj świetlówki T5 z UVB i umieść ją tak, by indeks UV w miejscu do wygrzewania wynosił około 3-4 (strefa Fergusona 3).

ŻYWIENIE

Tiliqua nigrolutea jest wszystkożerna. Podstawą diety jest mieszanka zieleniny, białka zwierzęcego i niewielkiej ilości owoców. Młode poniżej 12 miesięcy powinny dostawać 70-80 % białka, dorosłe około 50-60 %.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Tiliqua nigrolutea jest spokojna, a zwierzęta z hodowli często się oswajają. Gdy podnosisz zwierzę, całe ciało razem z ogonem powinno spoczywać na przedramieniu, a jedna ręka powinna być widoczna.

NATURALNY ZASIĘG

Australia.