herpy

SCYNKI

Western Blue-Tongued Lizard

Tiliqua occipitalis

Tiliqua occipitalis to masywny, naziemny scynk z południowej i środkowej Australii z brązowymi poprzecznymi pasami na ciele i ogonie oraz szerokim, niebieskim językiem, charakterystycznym dla rodzaju. Gatunek dorasta do około 40 cm długości, jest aktywny w dzień i wszystkożerny, potrzebuje dużego terrarium z UVB i ciepłym miejscem do wygrzewania. Rodzi żywe młode i rzadko spotyka się go w niewoli.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Cyclodus occipitalis; Cyclodus fasciatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**35-45 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Półpustynia i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-45 °C**
Temperatura w nocy	**15-22 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Wielkość miotu	**5 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**90-120 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik III**
Załącznik unijny	**Załącznik C**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). Większe jest lepsze. Powierzchnia dna jest ważniejsza niż wysokość, ponieważ zwierzę żyje na ziemi.
TEMPERATURA	Zapewnij gradient temperatur od 22-26 °C w chłodnej części do 28-32 °C w ciepłej części. Powierzchnia w miejscu do wygrzewania powinna mieć 35-45 °C, a zwierzę musi mieć możliwość wyboru, jak ciepło chce leżeć.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Gatunek pochodzi z suchych i półsuchych regionów i nie potrzebuje wysokiej wilgotności powietrza. Odpowiednie jest 30-50 %, mierzone w chłodnej części. Podłoże powinno być lekko wilgotne głębiej, ale nigdy mokre.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje zarówno UVB, jak i mocnego światła.
ŻYWIENIE	*Tiliqua occipitalis* jest wszystkożerny, a pokarm powinien być jak najbardziej urozmaicony.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Scynk jest płochliwy przez pierwsze dni, ale się oswaja i znosi spokojną manipulację. Podnoś go, podtrzymując całe ciało, tak aby stopy miały oparcie, nigdy nie trzymaj go brzuchem do góry i nigdy nie chwytaj za głowę ani ogon.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/scynki/tiliqua-occipitalis