herpy

SCYNKI

Scynk niebieskojęzyczny

Tiliqua scincoides

Masywny, ciężko zbudowany scynk z Australii i wschodniej Indonezji z szerokim, jaskrawoniebieskim językiem, który pokazuje, gdy czuje się zagrożony. *Tiliqua scincoides* jest aktywna w dzień, wszystkożerna i spokojna, osiąga 45-60 cm długości i może żyć około 20 lat. Wymaga dużego terrarium, UVB i ciepłego miejsca do wygrzewania.

Rodzina: Scincidae Nazwa angielska: Common Blue-tongued Skink Dawna nazwa: *Lacerta scincoides*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**45-60 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**400-600 g**
Długość życia	**15-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Sawanna i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-33 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-45 °C**
Temperatura w nocy	**18-24 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**18-36 miesięcy**
Wielkość miotu	**6-15 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**90-120 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik III**
Załącznik unijny	**Załącznik C**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 180 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość), co odpowiada nieco ponad 1 m² powierzchni dna. Większe jest lepsze, np. 180 × 120 × 90 cm.
TEMPERATURA	Zwierzę musi mieć wybór między 21-26 °C w chłodnym końcu a 28-33 °C w ciepłym końcu. Powierzchnia miejsca do wygrzewania powinna mieć 35-45 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Podgatunki australijskie potrzebują wilgotności powietrza 40-60 %, mierzonej w chłodnym końcu. Indonezyjska *T. s. chimaerea* wymaga 60-80 %.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje zarówno UVB, jak i mocnego światła. Użyj świetlówki T5 z UVB i umieść ją tak, żeby indeks UV w miejscu do wygrzewania wynosił około 3-4 (strefa Fergusona 3).
ŻYWIENIE	*Tiliqua scincoides* jest wszystkożerna. Podstawą diety jest mieszanka zieleniny, białka zwierzęcego i odrobiny owoców. Młode poniżej 12 miesięcy powinny dostawać 70-80 % białka, dorosłe około 50-60 %.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Tiliqua scincoides* jest spokojna, a zwierzęta z hodowli często stają się bardzo oswojone. Osobniki z odłowu łatwiej się stresują i są bardziej defensywne.
NATURALNY ZASIĘG	Australia i Indonezja.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/scynki/tiliqua-scincoides