herpy

SCYNKI

Blanchard's Helmet Skink

Tribolonotus blanchardi

Tribolonotus blanchardi to bardzo mały scynk z lasów Wysp Salomona i Bougainville. Mierzy zaledwie 3-4 cm od pyska do kloaki, żyje ukryty w wilgotnej ściółce wzdłuż małych leśnych strumieni i składa po jednym jaju. O tym gatunku i jego hodowli wiadomo bardzo niewiele.

Rodzina: Scincidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-26 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**80-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1 jaj**
Inkubacja	**65-85 dni** przy 23-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli *Tribolonotus blanchardi* wiadomo niewiele.
TEMPERATURA	*Tribolonotus blanchardi* nie korzysta z miejsc do wygrzewania. Utrzymuj 24-26 °C w dzień bez miejsca do wygrzewania i 20-22 °C w nocy.
WILGOTNOŚĆ I WODA	*Tribolonotus blanchardi* bardzo źle znosi przesuszenie. Wilgotność powietrza musi być wysoka, 80-90 %, a podłoże zawsze wilgotne. Zraszaj rano i wieczorem albo zastosuj automatyczny system zraszający.
OŚWIETLENIE I UVB	*Tribolonotus blanchardi* żyje ukryty w ściółce cienistego lasu.
ŻYWIENIE	*Tribolonotus blanchardi* żywi się owadami. Podawaj drobne owady karmowe: małe świerszcze, muszki owocowe, skoczogonki, małe karaczany i małe dżdżownice.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Tribolonotus blanchardi* jest płochliwy i większość czasu spędza w ukryciu. To zwierzę do obserwacji, a nie do brania na ręce. Nowemu osobnikowi daj co najmniej dwa tygodnie spokoju.
NATURALNY ZASIĘG	Wyspy Salomona i Papua-Nowa Gwinea.