herpy

SCYNKI

Red-Eyed Bush Crocodile Skink

Tribolonotus gracilis

Tribolonotus gracilis to płochliwy, aktywny o zmierzchu scynk z lasów deszczowych północnej Nowej Gwinei, z czerwonopomarańczową obwódką wokół oczu i rzędami ostrych, zagiętych do tyłu łusek wzdłuż grzbietu, które nadają mu opancerzony, niemal smoczy wygląd. Żyje w ukryciu w wilgotnej ściółce leśnej, potrafi wydawać dźwięki i składa tylko jedno jajo naraz. Najlepiej sprawdza się jako zwierzę do obserwacji, a nie do brania na ręce.

Rodzina: Scincidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**16-20 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-48 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1 jaj**
Zniesienia w roku	**1-6**
Inkubacja	**65-85 dni** przy 23-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Załącznik D**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Pojedyncze zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 45 × 45 cm, a większe jest lepsze. Para wymaga co najmniej 90 × 45 × 45 cm.
TEMPERATURA	*Tribolonotus gracilis* jest gatunkiem tropikalnym, ale w naturze nie wygrzewa się w słońcu. Utrzymuj w terrarium 24-26 °C w chłodniejszej części i 27-28 °C w ciepłej kryjówce, a w nocy pozwól temperaturze spaść do 22-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Gatunek bardzo źle znosi przesuszenie. Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w dzień i więcej w nocy, najlepiej około 90 %, a podłoże musi być zawsze wilgotne.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny o zmierzchu i w nocy. Zwierzę może żyć i rozmnażać się bez UVB, jeśli pokarm jest suplementowany wapniem i witaminą D3, ale słabe oświetlenie UVB daje najlepsze rezultaty i jest zalecane.
ŻYWIENIE	Gatunek jest owadożerny. Podstawą diety mogą być świerszcze, karaczany (np. *Blaptica dubia* i *Blaberus discoidalis*), mączniki, drewnojady, larwy zawisaka tytoniowca, jedwabniki, larwy muchy Hermetia, dżdżownice i ślimaki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Tribolonotus gracilis* to zwierzę do obserwacji, a nie do brania na ręce. Złapany piszczy, udaje martwego, próbuje uciec albo odrzuca ogon, a to go stresuje.
NATURALNY ZASIĘG	Papua-Nowa Gwinea i Indonezja.