herpy

SCYNKI

Spiny Skink

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae to mały, płochliwy scynk z nizinnych lasów deszczowych Nowej Gwinei z rzędami ostrych, zagiętych do tyłu łusek wzdłuż grzbietu. Żyje ukryty w wilgotnej ściółce leśnej, jest aktywny głównie o zmierzchu i składa tylko jedno jajo naraz. O utrzymaniu właśnie tego gatunku wiadomo niewiele, a najlepiej sprawdza się jako zwierzę do obserwacji.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Zonurus novaeguineae*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**16-20 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-48 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1 jaj**
Zniesienia w roku	**1-6**
Inkubacja	**65-85 dni** przy 23-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Załącznik D**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O utrzymaniu *Tribolonotus novaeguineae* wiadomo niewiele. Gatunek żyje w tym samym typie dna lasu deszczowego co *Tribolonotus gracilis* z północnej Nowej Gwinei, ma tę samą wielkość i w dużej mierze te same wymagania.
TEMPERATURA	Temperatura w dzień powinna wynosić 24-27 °C, a ciepła kryjówka z temperaturą 27-28 °C utrzymuje zwierzę w aktywności, mimo że nie wygrzewa się ono w słońcu. W nocy odpowiednie jest 22-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-90 %, najwyższa w nocy, a podłoże musi być zawsze wilgotne.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny o zmierzchu i nie potrzebuje mocnego miejsca do wygrzewania, ale 12 godzin światła dziennego na dobę utrzymuje rytm dobowy.
ŻYWIENIE	*Tribolonotus novaeguineae* jest owadożerny.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Tribolonotus novaeguineae* nadaje się do obserwacji, a nie do brania na ręce. Schwytany może wydawać dźwięki, udawać martwego, próbować uciec lub odrzucić ogon, a to go stresuje.
NATURALNY ZASIĘG	Indonezja i Papua-Nowa Gwinea.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/scynki/tribolonotus-novaeguineae