herpy

SCYNKI

Giant Spiny Skink

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti to rzadki, skryty scynk z wysp archipelagu Wysp Salomona i największy gatunek w swoim rodzaju. Ma kilowate, kolczaste łuski i kanciastą, opancerzoną głowę, żyje na dnie lasu i zakopuje się, a do tego potrafi wydawać dźwięki. Zalecenia hodowlane opierają się na klimacie oraz na bliskich krewnych, *Tribolonotus gracilis* i *Tribolonotus novaeguineae*.

Rodzina: Scincidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**11-13 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**75 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1 jaj**
Inkubacja	**65-85 dni** przy 23-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Brak danych (DD)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Wiedza o utrzymaniu *Tribolonotus ponceleti* jest bardzo skąpa. Klimat w obszarze występowania jest ciepły i wilgotny przez cały rok, a gatunek żyje w ściółce na dnie lasu.

TEMPERATURA

Utrzymuj w terrarium 24-27 °C w chłodniejszej części i 27-28 °C w ciepłej kryjówce, a w nocy pozwól temperaturze spaść do 22-24 °C. Scynk jest aktywny o zmierzchu i w nocy i raczej się nie wygrzewa, lecz ogrzewa się w kryjówce.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w dzień i więcej w nocy, najlepiej 80-90 %, a podłoże musi być zawsze wilgotne. Gatunek prawdopodobnie bardzo źle znosi przesuszenie, podobnie jak bliscy krewni.

OŚWIETLENIE I UVB

Zwierzę jest aktywne o zmierzchu i w nocy, a jego zapotrzebowanie na UVB nie zostało udokumentowane.

ŻYWIENIE

W naturze gatunek zjada stawonogi. Podstawą diety mogą być świerszcze, karaczany, mączniki, jedwabniki, larwy muchy czarnej (Hermetia illucens), dżdżownice i ślimaki.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Tribolonotus ponceleti to zwierzę do obserwowania, a nie do brania na ręce. Scynki z tego rodzaju udają martwe, próbują uciec, odrzucają ogon lub wydają dźwięki, gdy się je chwyta, i jest to dla nich stresujące.

NATURALNY ZASIĘG

Wyspy Salomona i Papua-Nowa Gwinea.