herpy

SCYNKI

False Poncelet's Helmet Skink

Tribolonotus pseudoponceleti

Tribolonotus pseudoponceleti to mały, skryty scynk z Bougainville i Buki w północnej części archipelagu Wysp Salomona. Ma ożebrowane, szorstkie łuski i trójkątną głowę, a żyje pod butwiejącymi pniami, zazwyczaj w parach. Hodowla jest prawie nieopisana, dlatego opiera się na trybie życia gatunku w naturze oraz na blisko spokrewnionych *Tribolonotus gracilis* i *Tribolonotus novaeguineae*.

Rodzina: Scincidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**4-7 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 30 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1 jaj**
Inkubacja	**65-85 dni** przy 23-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Hodowla *Tribolonotus pseudoponceleti* jest prawie nieopisana. Gatunek żyje w ciepłym i wilgotnym klimacie i ukrywa się pod butwiejącymi pniami.

TEMPERATURA

W dzień w chłodniejszej części powinno być 24-27 °C, a w ciepłej kryjówce 27-28 °C, w nocy zaś 22-24 °C. Gatunek nie pokazuje się na otwartej przestrzeni i nie wygrzewa się, lecz ogrzewa się pod pniami i korą.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w dzień i 80-90 % w nocy, a podłoże musi być zawsze wilgotne, ale nie mokre; gatunek preferuje miejsca wilgotne, lecz nie przesiąknięte wodą.

OŚWIETLENIE I UVB

Zapotrzebowanie na UVB nie zostało udokumentowane. Blisko spokrewnione gatunki radzą sobie bez UVB, jeśli pokarm jest suplementowany wapniem i witaminą D3, ale zaleca się słabe oświetlenie UVB.

ŻYWIENIE

Gatunek zjada małe stawonogi, w niewoli także termity. Podstawą diety mogą być małe świerszcze, karaczany, mączniki, jedwabniki, larwy muchy black soldier, dżdżownice i małe ślimaki. Ważne jest urozmaicenie.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Tribolonotus pseudoponceleti to zwierzę do obserwowania, a nie do brania na ręce. Odsłonięty przywiera płasko do ziemi i pozostaje w bezruchu albo powoli odpełza; rzadko próbuje uciekać.

NATURALNY ZASIĘG

Papua-Nowa Gwinea.