herpy

SCYNKI

Schmidt's Crocodile Skink

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti to mały, płochliwy scynk z Guadalcanal na Wyspach Salomona, z dwoma rzędami płytkowatych łusek wzdłuż grzbietu. Żyje w ukryciu w wilgotnej ściółce na dnie lasu i rodzi żywe młode, po jednym naraz, w przeciwieństwie do dwóch lepiej znanych krewnych, które składają jaja.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Pediporus schmidti*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**9-10 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**8-10 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Wielkość miotu	**1 młodych**
Ciąża	**65-85 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Tribolonotus schmidti* jest bardzo skąpa.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium *Tribolonotus schmidti* 24-27 °C w dzień, z ciepłą kryjówką o temperaturze 27-28 °C, a nocą pozwól temperaturze spaść do 22-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Dla *Tribolonotus schmidti* wilgotność powietrza powinna wynosić 70-90 %, a podłoże musi być zawsze wilgotne.
OŚWIETLENIE I UVB	*Tribolonotus schmidti* śpi nocą i prawdopodobnie jest aktywny w dzień i o zmierzchu w zacienionej ściółce.
ŻYWIENIE	*Tribolonotus schmidti* jest owadożerny. Podstawą diety mogą być świerszcze, karaczany, mączniki, małe larwy i dżdżownice. Ślimaki i robaki można podawać dla urozmaicenia. Młode osobniki karm codziennie, dorosłe co drugi dzień.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Tribolonotus schmidti* to płochliwy scynk żyjący w ukryciu, zwierzę do obserwowania, a nie do brania na ręce. Rodzaj potrafi wydawać dźwięki, ale nie zostało to udokumentowane dla tego gatunku.
NATURALNY ZASIĘG	Wyspy Salomona.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/scynki/tribolonotus-schmidti