herpy

WARANY

## Waran białogardły

# *Varanus albigularis*

*Varanus albigularis* to masywny, aktywny za dnia i chętnie kopiący waran z sawann i suchych lasów południowej i wschodniej Afryki. Osiąga 100-200 cm długości, jest ciekawski i może stać się bardzo oswojony, ale zamiast terrarium wymaga całego pomieszczenia, dużych wydatków na pokarm i wielu lat starannej opieki.

Rodzina: Varanidae  Nazwa angielska: White-throated Monitor

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **100-200 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Waga | **3 000-12 000 g** |
| Długość życia | **10-20 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Naziemny i kopiący nory** |
| Środowisko | **Półpustynia i sawanna** |
| Trudność | **Ekspert** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **300 × 200 × 150 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **24-26 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **35-45 °C** |
| Temperatura w nocy | **19-21 °C** |
| Wilgotność | **30-60%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 3 |
| Pokarm | **Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub w parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Wielkość zniesienia | **16-65 jaj** |
| Zniesienia w roku | **1-2** |
| Inkubacja | **150-180 dni**<br>przy 28-31 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Dorosły *Varanus albigularis* musi mieć co najmniej 300 × 200 × 150 cm (długość × szerokość × wysokość), a najlepiej całe pomieszczenie. |
| **TEMPERATURA** | Jako aktywny za dnia, wygrzewający się gad *Varanus albigularis* wymaga dużego gradientu temperatur. Temperatura powietrza wynosi 24-26 °C w dzień i 19-21 °C w nocy. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Gatunek pochodzi z suchych i półwilgotnych terenów sawannowych, a właściwa wilgotność powietrza w wybiegu nie została udokumentowana liczbowo. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | *Varanus albigularis* jest aktywnym za dnia, wygrzewającym się gadem i potrzebuje silnego światła. |
| **ŻYWIENIE** | W naturze *Varanus albigularis* jest prawdziwym generalistą. Zjada ślimaki, szarańczaki, krocionogi, chrząszcze i inne bezkręgowce, a okazjonalnie węże. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Varanus albigularis* nie jest zwierzęciem domowym w zwykłym sensie. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Angola, Botswana, Etiopia, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Somalia, Eswatini, Tanzania, Uganda, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe i Demokratyczna Republika Konga. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/warany/varanus-albigularis