herpy

WARANY

## Bogert's Monitor

# *Varanus bogerti*

*Varanus bogerti* to czarny, nadrzewny waran z wysp u południowo-wschodniego krańca Nowej Gwinei, należący do grupy waranów nadrzewnych skupionej wokół *Varanus prasinus*. Gatunek jest znany tylko z kilku okazów muzealnych i niemal nieznany w niewoli, dlatego zasady utrzymania opierają się na najbliższych krewnych.

Rodzina: Varanidae  Dawna nazwa: *Varanus prasinus bogerti*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **82-94 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **10-15 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny** |
| Środowisko | **Las deszczowy i mokradła** |
| Trudność | **Ekspert** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 80 × 180 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **24-34 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **45-50 °C** |
| Temperatura w nocy | **22-25 °C** |
| Wilgotność | **70-95%** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Owady i kręgowce** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub w parach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Wielkość zniesienia | **2-3 jaj** |
| Inkubacja | **157-203 dni**<br>przy 29-30 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza o utrzymaniu *Varanus bogerti* jest niewielka, a gatunek prawie nie był widywany w niewoli. |
| **TEMPERATURA** | W dzień temperatura powinna wynosić 24-34 °C, a w nocy 22-25 °C. Temperatura powierzchni w miejscach do wygrzewania powinna wynosić 45-50 °C. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-95 %. Zraszaj terrarium kilka razy na dobę świeżą wodą, najlepiej automatycznym systemem, i pozwól podłożu lekko przeschnąć między zraszaniami. Zwierzęta piją krople wody z liści i gałęzi. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje światła UVB. Stosuj lampę łączącą grzanie z UVB nad miejscem do wygrzewania, tak aby zwierzę mogło wybierać między cieniem a światłem, i celuj w strefę Fergusona 2. |
| **ŻYWIENIE** | Żywienie jest zapożyczone od *V. beccarii* i *V. prasinus*, które zjadają głównie duże stawonogi. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Gatunek jest prawdopodobnie płochliwy i nerwowy jak inne warany nadrzewne, a manipulowanie stresuje zwierzę. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Papua-Nowa Gwinea. |