herpy

WARANY

Biak Emerald Monitor

Varanus kordensis

Varanus kordensis to smukły, zielony waran nadrzewny z siecią ciemnych, pierścieniowatych plam, występujący wyłącznie na wyspie Biak na północ od Nowej Gwinei. Należy do grupy waranów nadrzewnych znanych z tego, że trudno je utrzymać i rozmnożyć, a szczegółowych danych hodowlanych dla tego konkretnego gatunku prawie nie ma.

Rodzina: Varanidae Dawna nazwa: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**70-90 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**8-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 80 × 180 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-34 °C**
Miejsce wygrzewania	**45-50 °C**
Temperatura w nocy	**22-25 °C**
Wilgotność	**75-95%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady i kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**2-5 jaj**
Zniesienia w roku	**1-3**
Inkubacja	**160-190 dni** przy 28-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Brak danych (DD)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Hodowla *Varanus kordensis* jest niemal taka sama jak w przypadku innych zielonych waranów nadrzewnych: duże, wysokie terrarium z wieloma kryjówkami, grubymi gałęziami i rurami korkowymi.

TEMPERATURA

Temperatury zapożyczono od *Varanus beccarii* i stanowią ostrożny punkt wyjścia dla *Varanus kordensis*. W dzień temperatura powinna wynosić 24-34 °C, a w nocy 22-25 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza musi być wysoka, około 75-95 %, i nie powinna spadać poniżej 75 %. Suche warunki prowadzą do odwodnienia i problemów z linieniem.

OŚWIETLENIE I UVB

Varanus kordensis jest aktywny w dzień i wygrzewa się w koronach drzew. Zapotrzebowanie na UVB nie jest znane dla tego gatunku, ale UVB jest zalecane.

ŻYWIENIE

Varanus kordensis żywi się głównie owadami. W niewoli podstawę diety stanowią świerszcze, karaczany, szarańcza i jaja, a kurczaka, mięso, krewetki i gryzonie podaje się tylko okazjonalnie.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Varanus kordensis jest na tyle mały, że ugryzienie rzadko bywa groźne, ale pazury są ostre i mogą powodować głębokie zadrapania, a ogon służy do chwytania, nie do smagania.

NATURALNY ZASIĘG

Indonezja.