herpy

WARANY

Banggai Island monitor

Varanus melinus

Varanus melinus to średniej wielkości, żółty waran z wysp Sula w Indonezji. Dorosłe osobniki są intensywnie żółte, a młode czarne w żółte plamy. Gatunek wymaga dużego terrarium z basenem i bardzo ciepłymi miejscami do wygrzewania, żywi się owadami i kręgowcami, a w naturze jest zagrożony, dlatego nadaje się wyłącznie dla doświadczonego hodowcy.

Rodzina: Varanidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**90-130 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**8-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**300 × 120 × 150 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**26-33 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**24-26 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Część wodna** głębokość 80 cm
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**2-12 jaj**
Inkubacja	**164-171 dni** przy 28-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Pojedyncze dorosłe zwierzę potrzebuje co najmniej 300 × 120 × 150 cm (długość × szerokość × wysokość), a im więcej, tym lepiej.
TEMPERATURA	Temperatura tła w terrarium wynosi w dzień 26-33 °C, a miejsce do wygrzewania pod lampami grzewczymi musi osiągać 40-45 °C, mierzone jako temperatura powierzchni termometrem na podczerwień.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza musi być wysoka, około 60-80 %, jak u spokrewnionych gatunków z grupy obejmującej *V. indicus*. Codziennie zraszaj młode wodą deszczową; basen również podnosi wilgotność.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i dużo się wygrzewa. Zapewnij UVB ze świetlówek lub lamp grzewczych z UVB, tak aby zwierzę mogło samo wybierać dawkę (strefa Fergusona 3).
ŻYWIENIE	Gatunek jest mięsożerny.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Dorosłe zwierzęta tej wielkości mają zęby i pazury, które mogą zadać głębokie rany, a bocznie spłaszczony ogon może służyć do uderzania. Jak silne są ugryzienia i uderzenia ogonem właśnie u tego gatunku, nie zostało udokumentowane.
NATURALNY ZASIĘG	Indonezja.