herpy

WARANY

## Mitchell's water monitor

# *Varanus mitchelli*

*Varanus mitchelli* to smukły, półwodny waran z północnej Australii, zwykle o długości 60-70 cm, maksymalnie około 1 m, z bocznie spłaszczonym ogonem służącym do pływania. Gatunek jest płochliwy, w hodowli niemal nieznany i uznany za krytycznie zagrożony, ponieważ toksyny zawleczonej ropuchy *Rhinella marina* zdziesiątkowały jego populacje. Doświadczeń z utrzymaniem jest bardzo mało i jest to gatunek wyłącznie dla bardzo doświadczonych hodowców.

Rodzina: Varanidae

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **60-96 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **10-15 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Nadrzewny i półwodny** |
| Środowisko | **Sawanna i mokradła** |
| Trudność | **Ekspert** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **200 × 100 × 150 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **28-32 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **40-50 °C** |
| Temperatura w nocy | **22-25 °C** |
| Wilgotność | **50-80%** |
| Woda | **Część wodna**<br>głębokość 20-30 cm |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 3 |
| Pokarm | **Owady i kręgowce** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Wielkość zniesienia | **7-27 jaj** |
| Zniesienia w roku | **2-6** |
| Inkubacja | **90-289 dni**<br>przy 26-31 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Krytycznie zagrożony (CR)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Doświadczeń z utrzymaniem *Varanus mitchelli* jest niemal brak, dlatego zalecenia opierają się na pokrewnym *V. acanthurus*, na jednym udanym odchowie tego gatunku oraz na jego życiu w naturze. |
| **TEMPERATURA** | W dzień temperatura w terrarium powinna wynosić 28-32 °C, a wygrzewisko powinno osiągać 40-50 °C, mierzone jako temperatura powierzchni termometrem na podczerwień. Na noc ogrzewanie się wyłącza, a temperatura spada do 22-25 °C. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 50-80 %: nieco wyższa nocą i przy wodzie, niższa przy wygrzewisku. Część wodna i wilgotne podłoże utrzymują wilgotność. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Gatunek jest półwodny, więc stała część wodna jest elementem terrarium, a nie tylko poidłem. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek jest dzienny i wygrzewa się, dlatego potrzebuje UVB odpowiadającego strefie Fergusona 3. |
| **ŻYWIENIE** | W naturze gatunek zjada głównie szarańczaki, pająki i ryby, ale także inne bezkręgowce, płazy, gady i ich jaja, małe ssaki i ptaki. Owady są więc dobrą podstawą diety, uzupełnianą małymi rybami. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Varanus mitchelli* to płochliwy i ostrożny gatunek, który dużo się ukrywa i nie jest zwierzęciem do codziennego brania na ręce. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Australia. |