herpy

WARANY

Spotted Tree Monitor

Varanus similis

Varanus similis to niewielki, dzienny waran nadrzewny z północnej Australii i Nowej Gwinei. Trzyma się go w wysokim terrarium z korkiem, kryjówkami i ciepłym miejscem do wygrzewania, żywi się owadami karmowymi i stanowi rzadką, nadrzewną alternatywę dla naziemnych małych waranów. Doświadczenie w hodowli jest jednak niewielkie.

Rodzina: Varanidae Dawna nazwa: *Varanus timorensis similis; Varanus scalaris similis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**45-60 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**8-12 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna i suchy las**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**80 × 80 × 130 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**25-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-42 °C**
Temperatura w nocy	**22-25 °C**
Wilgotność	**60-80%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**3-18 jaj**
Inkubacja	**120-136 dni** przy 28-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły osobnik potrzebuje wysokiego terrarium o wymiarach co najmniej 80 × 80 × 130 cm (długość × szerokość × wysokość). Para potrzebuje więcej miejsca, najlepiej 100 × 100 × 200 cm.

TEMPERATURA

Temperatura dzienna w terrarium wynosi 25-30 °C, z 30 °C w górnych partiach i 25 °C przy dnie. Miejsce do wygrzewania to gałąź lub kamień pod lampą punktową, która daje lokalną temperaturę powierzchni 40-42 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność względną utrzymuje się na poziomie 60-80 %. Osiąga się to, zraszając terrarium wodą wieczorem i pozwalając podłożu zatrzymywać wilgoć, ewentualnie z użyciem słabego kabla grzewczego pod podłożem.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest dzienny i potrzebuje mocnego światła oraz UVB.

ŻYWIENIE

Zwierzęta przyjmują wszystkie popularne owady karmowe i nie są wybredne. Karaczany (*Blaptica dubia* i *Blaberus atropus*) odpowiedniej wielkości nadają się na podstawę diety, a szarańcza jest popularnym urozmaiceniem.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Zwierzęta odłowione z natury są początkowo płochliwe, ale to naturalne zachowanie: gatunek ucieka lub chowa się, dopóki zagrożenie nie minie, i poluje z zasadzki. Nie oznacza to, że jest wyjątkowo lękliwy.

NATURALNY ZASIĘG

Australia i Papua-Nowa Gwinea.