herpy

WARANY

Solomon Island spiny monitor

Varanus spinulosus

Varanus spinulosus to rzadki i niemal nieznany waran z Wysp Salomona i Bougainville, rozpoznawalny po szorstkiej jak papier ścierny, kolczastej łusce i rzędach dużych żółtych plam na ciemnym tle. Zalecenia dotyczące hodowli opierają się na gatunkach pokrewnych, ponieważ doświadczeń z tym gatunkiem w niewoli prawie nie ma.

Rodzina: Varanidae Dawna nazwa: *Varanus indicus spinulosus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**90-100 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**300 × 120 × 200 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-48 °C**
Temperatura w nocy	**24-25 °C**
Wilgotność	**60-90%**
Woda	**Część wodna** głębokość 10-40 cm
Temperatura wody	**26-29 °C**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**4-7 jaj**
Inkubacja	**150-195 dni** przy 28-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wymiary zapożyczono od pokrewnych waranów o długości ok. 100-140 cm.
TEMPERATURA	Temperatury dla *Varanus spinulosus* zapożyczono od *V. juxtindicus* i innych gatunków z grupy *V. indicus*. Temperaturę powietrza utrzymuj na poziomie 27-30 °C w dzień i 24-25 °C w nocy, a wody 26-29 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-80 % w dzień i więcej w nocy, do około 90 %. Osiąga się to dzięki dużemu zbiornikowi wodnemu, wilgotnemu podłożu i codziennemu zraszaniu.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Krewni z grupy *V. indicus* chętnie pływają, nurkują i śpią w wodzie, dlatego zaleca się stały zbiornik wodny, choć gatunek nie jest znany jako półwodny.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i wygrzewa się w pełnym słońcu w środku dnia, więc jako dorosły potrzebuje silnego światła i UVB.
ŻYWIENIE	Na wolności gatunek zjada stawonogi, jaja nogali, ryby i małe ptaki. Wychodzi z lasu, by zabierać wnętrzności z patroszonych ryb, plądruje kurniki i szuka pokarmu w strefie pływów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Na wolności gatunek jest płochliwy i ucieka w korony palm. Złapane zwierzę może syczeć, a mimo to szybko się uspokoić, nie próbując gryźć, ale więcej o temperamencie nie wiadomo.
NATURALNY ZASIĘG	Wyspy Salomona i Papua-Nowa Gwinea.