herpy

WĘŻE

Boa dusiciel

Boa constrictor

Boa constrictor to masywny boa z Ameryki Południowej, występujący głównie na wschód od Andów, brązowy do szarego, z ciemnymi plamami w kształcie siodeł i ogonem, który u wielu form lokalnych jest rdzawobrązowy do czerwonego. Osiąga 180-300 cm, jest aktywny o zmierzchu i w nocy i żyje 20-30 lat. Jest większy od blisko spokrewnionego *Boa imperator*, wymaga dużego terrarium, rzadkich posiłków i opiekuna, który jest gotów wziąć za niego odpowiedzialność na dziesięciolecia.

Rodzina: Boidae Nazwa angielska: Boa Constrictor Dawna nazwa: *Constrictor constrictor*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**180-300 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**20-30 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Sawanna, suchy las i las deszczowy**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**240 × 120 × 120 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-32 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**55-75%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**18-48 miesięcy**
Wielkość miotu	**10-65 młodych**
Ciąża	**100-120 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły osobnik powyżej 240 cm potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 240 × 120 × 120 cm (długość × szerokość × wysokość), a mniejsze dorosłe zwierzęta o długości 180-240 cm co najmniej 180 × 90 × 90 cm.

TEMPERATURA

Potrzebny jest gradient od chłodnej do ciepłej strefy. Powietrze przy miejscu do wygrzewania powinno mieć 30-32 °C, a chłodny koniec 24-26 °C, a całe terrarium powinno obejmować strefy między 24 a 32 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 55-75 % i nieco się wahać. Krótkotrwałe przekroczenie 70 % nie szkodzi, jeśli terrarium może potem przeschnąć, natomiast stała wilgoć prowadzi do pleśni.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest nocny i nie potrzebuje silnego światła, ale UVB jest zalecane. Należy do strefy Fergusona 2: okazjonalnie wygrzewający się.

ŻYWIENIE

B. constrictor jest mięsożerny i musi dostawać całe ofiary. Młode osobniki dostają myszy i małe szczury, a dorosłe szczury, młode króliki, świnki morskie, kurczęta i przepiórki. Urozmaicenie jest zdrowe.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

B. constrictor to inteligentny wąż o indywidualnym charakterze. Niektóre osobniki tolerują i lubią branie na ręce, inne wolą mieć spokój. Młode i młodociane osobniki są często nerwowe i mogą syczeć i gryźć.

NATURALNY ZASIĘG

Kolumbia, Wenezuela, Gujana, Gujana Francuska, Surinam, Ekwador, Peru, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Argentyna i Trynidad i Tobago.