herpy

WĘŻE

Boa piaskowa kenijska

Eryx colubrinus

Eryx colubrinus to niewielki, masywnie zbudowany boa z suchych obszarów Afryki Wschodniej, który większość czasu spędza zakopany w piasku, wystawiając nad powierzchnię jedynie skierowane ku górze oczy. Jest spokojny, nie potrzebuje dużo miejsca i może dożyć 20-30 lat, dlatego to dobry wybór dla osoby, która chce mieć swojego pierwszego węża.

Rodzina: Boidae Nazwa angielska: Kenyan Sand Boa Dawna nazwa: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**40-65 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**20-30 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia i półpustynia**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**26-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**33-35 °C**
Temperatura w nocy	**22-25 °C**
Wilgotność	**20-40%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Wielkość miotu	**10-20 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**120-180 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły *Eryx colubrinus* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 30 × 30 cm (długość × szerokość × wysokość), najlepiej 90 × 45 × 45 cm. Samice większe od przeciętnej powinny dostać więcej niż minimum.

TEMPERATURA

Eryx colubrinus dobrze znosi suche, ciepłe warunki. Terrarium musi mieć ciepłą i chłodną strefę. Powierzchnia pod źródłem ciepła powinna mieć 33-35 °C, a chłodna strona 26-28 °C. Nocą temperatura może spaść do 22-25 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Eryx colubrinus żyje w suchym klimacie, a terrarium przez większość czasu powinno być suche. Wilgotność powietrza najlepiej utrzymywać na poziomie około 20-40 %; wartość ta jest szacunkiem na podstawie siedliska.

OŚWIETLENIE I UVB

Eryx colubrinus jest najbardziej aktywny o zmierzchu i nocą i może żyć bez UVB, ale zalecana jest słaba świetlówka UVB, ponieważ wspiera rytm dobowy i pokrywa zapotrzebowanie na witaminę D3.

ŻYWIENIE

Eryx colubrinus jest mięsożerny i zjada całe ofiary. Podstawą diety są myszy: dorosłe samice mogą zjeść dużą dorosłą mysz, dorosłe samce dużą skoczkę (hopper).

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Eryx colubrinus jest spokojny i rzadko gryzie. Daj nowym zwierzętom dwa tygodnie na aklimatyzację i zacznij brać je na ręce dopiero wtedy, gdy regularnie jedzą.

NATURALNY ZASIĘG

Egipt, Sudan, Sudan Południowy, Etiopia, Erytrea, Kenia, Tanzania i Somalia.