herpy

WĘŻE

Wąż świnionosy

Heterodon nasicus

Heterodon nasicus to mały, krępy wąż z rodziny połozowatych, pochodzący z północnoamerykańskich prerii, o zadartym pysku, którym kopie w luźnej ziemi. Zagrożony nadyma się, syczy, a w końcu udaje martwego. Jest aktywny w dzień, spokojny i łatwy w utrzymaniu, dlatego to dobry pierwszy wybór wśród węży. Ma zęby jadowe z tyłu szczęki i słaby jad; ugryzienia zdarzają się rzadko, ale mogą wywołać wyraźny obrzęk.

Rodzina: Colubridae Nazwa angielska: Western Hognose Snake Dawna nazwa: *Heterodon gloydi*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**35-90 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**80-400 g**
Długość życia	**15-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**23-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**31-35 °C**
Temperatura w nocy	**16-22 °C**
Wilgotność	**30-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Zimowanie	**5-15 °C** 4-12 tygodni
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**2-23 jaj**
Zniesienia w roku	**1-2**
Inkubacja	**51-64 dni** przy 26-28 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 90 × 45 × 40 cm (długość × szerokość × wysokość).
TEMPERATURA	Utrzymuj wyraźny gradient. W ciepłym końcu musi być miejsce do wygrzewania o temperaturze 31-35 °C, mierzonej na powierzchni, przy temperaturze powietrza poza nim 23-27 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić około 30-60 %. Gatunek pochodzi z suchych regionów i nie potrzebuje wilgotnego powietrza, ale zbyt suche powietrze i pylące podłoże powodują zabrudzenia nozdrzy i zalegające linienie.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i korzysta z jasnego światła dziennego. Światło może palić się 12 godzin na dobę przez cały rok albo podążać za porami roku: 14-16 godzin wiosną i latem oraz 8-10 godzin jesienią i zimą.
ŻYWIENIE	W naturze *H. nasicus* je głównie ropuchy i inne płazy, ale także jaszczurki, gryzonie, jaja gadów, ptasie jaja, a czasem inne węże. W niewoli podstawowym pokarmem są mrożone, rozmrożone myszy.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Heterodon nasicus* jest spokojny i łatwy w obsłudze. Groźby to blef, a wąż prawie nigdy nie gryzie w obronie. Po ataku pozostaw go, by się uspokoił, i nie przeszkadzaj mu, gdy udaje martwego.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone i Kanada.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/weze/heterodon-nasicus