herpy

WĘŻE

Gray-banded Kingsnake

Lampropeltis alterna

Lampropeltis alterna to smukły wąż z rodzaju królewskich, pochodzący z pustyni Chihuahua na południowym zachodzie USA i w północnym Meksyku, znany ze srebrnoszarego tła z pomarańczowymi, czerwonymi i czarnymi poprzecznymi pasami. Osiąga 70-120 cm, jest spokojny i trzyma się go w suchym terrarium ze skalnymi kryjówkami. W naturze żywi się głównie jaszczurkami, ale w niewoli zwykle przyjmuje myszy i może dożyć ponad 25 lat.

Rodzina: Colubridae Dawna nazwa: *Ophibolus alternus; Lampropeltis blairi; Lampropeltis mexicana alterna*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**70-120 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-30 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Pustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**20-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Zimowanie	**13-16 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**3-13 jaj**
Inkubacja	**55-70 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM
Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 90 × 45 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość).

TEMPERATURA
W terrarium musi być wyraźny gradient temperatury, aby zwierzę mogło samo wybrać miejsce. Pod źródłem ciepła powierzchnia powinna mieć 29-32 °C, a w chłodnej części 20-24 °C. Powietrze w terrarium ma w dzień 20-28 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA
Gatunek pochodzi z suchego obszaru i potrzebuje niskiej do umiarkowanej wilgotności powietrza, 30-50 %. Wyższe wartości utrzymujące się dłużej prowadzą do problemów ze skórą i infekcji dróg oddechowych.

OŚWIETLENIE I UVB
Gatunek jest nocny i skryty, a w naturze dostaje niewiele światła słonecznego. UVB nie jest konieczne, ale zaleca się je ze względu na dobrostan.

ŻYWIENIE
W naturze głównym pokarmem są jaszczurki, ale w niewoli zwierzęta zwykle jedzą rozmrożone myszy, które są najbezpieczniejszą dietą. Nie podawaj żywych gryzoni, bo mogą pogryźć i zranić węża.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM
L. alterna jest spokojny i tolerancyjny i dobrze nadaje się na pierwszego węża. Daj nowemu zwierzęciu około dwóch tygodni spokoju i zacznij brać je na ręce, gdy zacznie regularnie jeść.

NATURALNY ZASIĘG
Stany Zjednoczone i Meksyk.