herpy

WĘŻE

Lampropeltis kalifornijski

Lampropeltis californiae

Lampropeltis californiae to gładki, lśniący wąż królewski z zachodniej części Ameryki Północnej, czarny lub ciemnobrązowy z białymi do jasnożółtych poprzecznymi pasami albo z pojedynczym białym pasem wzdłuż grzbietu. Osiąga 75-120 cm, zjada gryzonie i inne węże, jest odporny i dobrze znosi branie na ręce. Żyje ponad 20 lat i trzyma się go w terrarium o układzie poziomym z miejscem do wygrzewania i umiarkowaną wilgotnością powietrza.

Rodzina: Colubridae Nazwa angielska: California Kingsnake Dawna nazwa: *Lampropeltis getula californiae*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**75-120 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**Za dnia, o zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Półpustynia i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-15 jaj**
Inkubacja	**60-70 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM
Dorosły osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). Większe jest lepsze, bo gatunek jest aktywny i eksploruje całe terrarium.

TEMPERATURA
Zwierzę reguluje temperaturę, przemieszczając się między ciepłymi a chłodnymi miejscami, więc w terrarium musi być wyraźny gradient.

WILGOTNOŚĆ I WODA
Wilgotność powietrza powinna wynosić 40-60 %, mierzona cyfrowym higrometrem pośrodku terrarium. Jest wyższa w chłodnym końcu i w nocy, a niższa w ciepłym końcu, i to normalne.

OŚWIETLENIE I UVB
Gatunek należy do strefy Fergusona 2: w naturze od czasu do czasu się wygrzewa i dostaje trochę światła słonecznego. Może obyć się bez UVB, ale UVB jest zalecane dla jak najlepszego dobrostanu.

ŻYWIENIE
L. californiae jest mięsożerny i musi dostawać całe ofiary. Najważniejszym źródłem pokarmu w niewoli są myszy, a gdy zwierzę rośnie, stosuje się młode szczury.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM
L. californiae jest odporny i tolerancyjny, co jest jednym z powodów, dla których należy do najczęściej hodowanych węży. Daj nowemu zwierzęciu około 2 tygodni spokoju i zacznij brać je na ręce dopiero wtedy, gdy regularnie je.

NATURALNY ZASIĘG
Stany Zjednoczone i Meksyk.