herpy

WĘŻE

# *Lampropeltis getula*

*Lampropeltis getula* to duży, lśniący wąż królewski z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, czarny lub ciemnobrązowy z wąskimi, białymi do żółtych poprzecznymi pasami, które tworzą wzór przypominający łańcuch. Osiąga 90-150 cm, zjada gryzonie, jaszczurki i inne węże, jest odporny i tolerancyjny. Może żyć ponad 20 lat i trzyma się go pojedynczo w terrarium poziomym z miejscem do wygrzewania i umiarkowaną wilgotnością powietrza.

Rodzina: Colubridae  Nazwa angielska: Common Kingsnake  Dawna nazwa: *Lampropeltis getula getula*

## NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **90-150 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **15-30 lat** |
| Aktywność | **Za dnia i o zmierzchu** |
| Tryb życia | **Naziemny** |
| Środowisko | **Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej** |
| Trudność | **Początkujący** |

### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **150 × 60 × 60 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **21-28 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **29-32 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-22 °C** |
| Wilgotność | **40-60%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Kręgowce** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo** |

### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **12-48 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **3-25 jaj** |
| Inkubacja | **60-70 dni**<br>przy 26-29 °C |

### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Niewymieniony** |
| Załącznik unijny | **Niewymieniony** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

**TERRARIUM**

Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 150 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). Większe jest lepsze, bo gatunek jest aktywny i eksploruje całe terrarium.

**TEMPERATURA**

Zwierzę reguluje temperaturę, przemieszczając się między miejscami ciepłymi i chłodnymi, więc terrarium musi mieć wyraźny gradient.

**WILGOTNOŚĆ I WODA**

Wilgotność powietrza powinna wynosić 40-60 %, mierzona higrometrem cyfrowym na środku terrarium. Jest wyższa w chłodnym końcu i w nocy, a niższa w ciepłym końcu, i jest to normalne. Wartości te dotyczą węży królewskich ogólnie.

**OŚWIETLENIE I UVB**

Gatunek jest aktywny w dzień i w naturze wygrzewa się na słońcu. Może obejść się bez UVB, ale UVB jest zalecane dla najlepszego dobrostanu. Odpowiada to strefie Fergusona 2.

**ŻYWIENIE**

*L. getula* jest mięsożerny i musi dostawać całe ofiary. Najważniejszym pokarmem w niewoli są myszy, a gdy zwierzę rośnie, stosuje się młode szczury.

**ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM**

*L. getula* jest odporny i tolerancyjny. Daj nowemu zwierzęciu około 2 tygodni spokoju i zacznij brać je na ręce dopiero wtedy, gdy regularnie je.

**NATURALNY ZASIĘG**

Stany Zjednoczone.