herpy

WĘŻE

Speckled Kingsnake

Lampropeltis holbrooki

Lampropeltis holbrooki to średniej wielkości do dużego lampropeltis ze środkowej i południowej części USA, czarny z małą żółtobiałą plamką na niemal każdej łusce, przez co wzór przypomina sól z pieprzem. Osiąga 90-120 cm, zjada gryzonie, jaszczurki, żaby i inne węże, jest odporny i łatwy w utrzymaniu. Trzyma się go pojedynczo w terrarium podłogowym z miejscem do wygrzewania i umiarkowaną wilgotnością; może żyć ponad 20 lat.

Rodzina: Colubridae Dawna nazwa: *Lampropeltis getula holbrooki; Coronella sayi*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**90-120 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-15 jaj**
Inkubacja	**60-70 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu właśnie *Lampropeltis holbrooki* jest niewielka.
TEMPERATURA	Zwierzę reguluje temperaturę ciała, przemieszczając się między ciepłymi a chłodnymi miejscami, dlatego terrarium musi mieć wyraźny gradient.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 40-60 %, mierzona cyfrowym higrometrem pośrodku terrarium. Jest wyższa w chłodnym końcu i w nocy, a niższa w ciepłym końcu, i to jest normalne.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i w naturze się wygrzewa. Może obejść się bez UVB, ale UVB jest zalecane dla najlepszego dobrostanu. Odpowiada to strefie Fergusona 2.
ŻYWIENIE	*L. holbrooki* jest mięsożerny i musi dostawać całe ofiary. Podstawowym pokarmem są myszy, a gdy wąż rośnie, podaje się młode szczury.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*L. holbrooki* jest odporny i tolerancyjny. Daj nowemu zwierzęciu około 2 tygodni spokoju i zacznij brać je na ręce dopiero wtedy, gdy regularnie je.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/weze/lampropeltis-holbrooki