herpy

WĘŻE

Black Kingsnake

Lampropeltis nigra

Lampropeltis nigra to średniej wielkości do dużego lampropeltis ze wschodniej części USA, czarny, a w południowej części zasięgu każda łuska ma małą żółtą lub białą plamkę. Osiąga 90-120 cm, zjada gryzonie, jaszczurki, żaby i inne węże, jest odporny i łatwy w utrzymaniu. Trzyma się go pojedynczo w terrarium podłogowym z miejscem do wygrzewania i umiarkowaną wilgotnością; może żyć ponad 20 lat.

Rodzina: Colubridae Dawna nazwa: *Lampropeltis getula nigra; Ophibolus getulus niger*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**90-120 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**21-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-15 jaj**
Inkubacja	**60-70 dni** przy 26-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Wiedza o utrzymaniu specyficzna dla *Lampropeltis nigra* jest skąpa. Podane tu wartości zaczerpnięto od lampropeltisów ogólnie, zwłaszcza od *Lampropeltis californiae* i *Lampropeltis getula*, które mają takie same wymagania.

TEMPERATURA

Zwierzę reguluje temperaturę, przemieszczając się między ciepłymi a chłodnymi miejscami, dlatego w terrarium musi być wyraźny gradient.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 40-60 %, mierzona higrometrem cyfrowym na środku terrarium. W chłodnym końcu i w nocy jest wyższa, a w ciepłym końcu niższa, i jest to normalne. Należy unikać zawilgoconego, dusznego powietrza.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny głównie w dzień i w naturze wygrzewa się w słońcu. Może obyć się bez UVB, ale UVB jest zalecane dla najlepszego dobrostanu. Odpowiada to strefie Fergusona 2.

ŻYWIENIE

L. nigra jest mięsożercą i musi dostawać całe ofiary. Standardowym pokarmem są myszy, a gdy zwierzę rośnie, podaje się młode szczury.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

L. nigra jest odporny i tolerancyjny. Daj nowemu zwierzęciu około 2 tygodni spokoju i zacznij brać je na ręce dopiero wtedy, gdy regularnie je.

NATURALNY ZASIĘG

Stany Zjednoczone.