herpy

WĘŻE

Pończosznik zwyczajny

Thamnophis sirtalis

Thamnophis sirtalis to smukły, aktywny za dnia i ciekawski wąż z jasnymi pasami wzdłuż ciała. Żyje w pobliżu wody od południowej Kanady przez większość Stanów Zjednoczonych po północny Meksyk. Jest odporny, pozostaje aktywny i widoczny w ciągu dnia i może żywić się rozmrożonymi myszami, ale jest mistrzem ucieczek i wymaga całkowicie szczelnego terrarium.

Rodzina: Colubridae Nazwa angielska: Common Garter Snake

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**50-100 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**6-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**23-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**35-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Zimowanie	**8-15 °C** 8-16 tygodni
Pokarm	**Kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**18-24 miesięcy**
Wielkość miotu	**10-40 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**60-90 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły *Thamnophis sirtalis* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 100 × 50 × 50 cm (długość × szerokość × wysokość), a samica powyżej 80 cm - 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATURA

Niezbędny jest wyraźny gradient temperatur. Miejsce do wygrzewania powinno mieć 29-32 °C mierzone na powierzchni, chłodna część 23-27 °C, a w nocy 18-22 °C. Źródło ciepła wyłącza się na noc.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 35-60 %, najwyższa w chłodnej części i w nocy. Terrarium nie może być mokre, bo stała wilgoć powoduje pęcherze na brzuchu.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny za dnia i dobrze się czuje w silnym świetle dziennym. UVB nie jest bezwzględnie konieczne, ale jest zalecane i często sprawia, że wąż jest bardziej aktywny.

ŻYWIENIE

Thamnophis sirtalis przyjmuje inne ofiary niż większość węży: dżdżownice, ryby i gryzonie. Owadów, takich jak świerszcze i mączniki, nie je.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Thamnophis sirtalis jest szybki i ciekawski i zwykle się oswaja, jeśli od młodości jest regularnie brany do ręki.

NATURALNY ZASIĘG

Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone.