herpy

ŻABY

## Blue-sided Treefrog

# *Agalychnis annae*

*Agalychnis annae* to rzekotka o długości 6-8 cm z lasów górskich Kostaryki: zielona na grzbiecie, z pomarańczowymi oczami i błękitnymi bokami oraz udami. Prowadzi nocny tryb życia, żyje wysoko w roślinności i w naturze jest gatunkiem narażonym. Wymaga chłodnego i przewiewnego terrarium: w dzień 20-24 °C i stosunkowo suche powietrze, a dopiero wieczorem obfite zraszanie.

Rodzina: Phyllomedusidae  Dawna nazwa: *Phyllomedusa annae*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **6-8 cm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **5-10 lat** |
| Aktywność | **W nocy** |
| Tryb życia | **Nadrzewny** |
| Środowisko | **Las deszczowy i las górski** |
| Toksyny skórne | **Brak znanych** |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 60 cm**<br>D × S × W dla 4 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **20-24 °C** |
| Temperatura w nocy | **15-18 °C** |
| Wilgotność | **50-75%** |
| Woda | **Miska z wodą**<br>głębokość 2-3 cm |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 3 |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **W parach lub w grupach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki w wodzie** |
| Miejsce składania jaj | **Na liściach nad wodą** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **47-162** |
| Czas do wyklucia | **5-8 dni**<br>przy 22-24 °C |
| Okres larwalny | **60-250 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Gotowa karma** |
| Opieka nad potomstwem | **Brak** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| IUCN | **Narażony (VU)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Bezpośredniej wiedzy o utrzymaniu *Agalychnis annae* jest niewiele, dlatego podane tu wartości częściowo zapożyczono od *Agalychnis moreletii*, która żyje na tej samej wysokości, w tym samym typie lasu górskiego i ma takie same wymagania. |
| **TEMPERATURA** | *Agalychnis annae* pochodzi z wyżej położonych lasów niż bardziej znane rzekotki i nie znosi dłużej utrzymującego się ciepła. W dzień temperatura powinna wynosić 20-24 °C i nie powinna przekraczać 25 °C, nawet krótkotrwale. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | W dzień, gdy żaby śpią, wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 50-75 %. Wieczorem, po zgaszeniu światła, terrarium obficie się zrasza, tak aby wilgotność wzrosła do 80-100 % i w ciągu nocy znów spadła. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | W terrarium zawsze musi stać miska z czystą wodą. Wystarczy miska o średnicy około 20 cm z 2-3 cm wody, z której żaby łatwo się wydostaną; gładkie kamienie w misce zapobiegają utonięciu mniejszych osobników. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | UVB jest zalecane, ponieważ witamina D jest niezbędna do gospodarki wapniowej, a owady prawie jej nie zawierają. Strefę Fergusona 3 zapożyczono od *Agalychnis moreletii*: średni indeks UV 1-2,6 w miejscach, gdzie żaby odpoczywają. |
| **ŻYWIENIE** | *Agalychnis annae* zjada wyłącznie owady. Najlepszym pokarmem podstawowym są świerszcze bananowe, jeśli przez kilka dni przed podaniem żabom karmi się je pożywną karmą. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Agalychnis annae* śpi w dzień na liściach i jest aktywna w nocy. Porusza się powoli i wspina się, przekładając ręka za ręką, ale wystraszona skacze daleko, więc otwieraj terrarium ostrożnie. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Kostaryka. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/agalychnis-annae