herpy

ŻABY

Gliding Leaf Frog

Agalychnis spurrelli

Agalychnis spurrelli to rzekotka o długości 5-9 cm z wilgotnych lasów nizinnych Kostaryki, Panamy, Kolumbii i Ekwadoru: zielona na grzbiecie z białymi plamkami, z pomarańczowymi bokami i ciemnoczerwoną tęczówką. Jest aktywna nocą, żyje wysoko w koronach drzew i potrafi szybować z gałęzi na gałąź dzięki dużym błonom pławnym. W terrarium jest odporna i łatwo się rozmnaża, jeśli terrarium utrzymuje się w czystości i pozwala mu przeschnąć w ciągu dnia.

Rodzina: Phyllomedusidae Dawna nazwa: *Agalychnis litodryas*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**5-9 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-27 °C**
Temperatura w nocy	**20-23 °C**
Wilgotność	**65-75%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 2-3 cm
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na liściach nad wodą**
Dojrzałość płciowa	**12-18 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**30-110**
Czas do wyklucia	**7-9 dni** przy 24-26 °C
Okres larwalny	**42-63 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Agalychnis spurrelli* żyje wysoko w roślinności, dlatego wysokość terrarium i liczba gałęzi są ważniejsze niż powierzchnia dna. Terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 45 × 60 cm pomieści małą grupę czterech zwierząt.
TEMPERATURA	W dzień temperatura w terrarium powinna wynosić 22-27 °C, a w nocy może spaść o 3-5 °C, do 20-23 °C. Nie jest potrzebny ciepły punkt grzewczy: wystarczy lekkie dogrzanie pomieszczenia lub mata grzewcza na boku terrarium.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Poza sezonem rozrodczym wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 65-75 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	W terrarium zawsze musi stać duża, płaska miska z czystą wodą, do której żaby łatwo wchodzą i z której łatwo wychodzą.
OŚWIETLENIE I UVB	Terrarium potrzebuje 12 godzin światła i 12 godzin ciemności. Oświetlenie roślinne LED lub świetlówki daje roślinom to, czego potrzebują, a zwierzętom wyraźny dzień.
ŻYWIENIE	*Agalychnis spurrelli* zjada żywe owady. Podstawą diety są świerszcze domowe o odpowiedniej wielkości, uzupełniane np. karaczanami, larwami barciaka i muchami domowymi.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Agalychnis spurrelli* jest spokojna i aktywna nocą. Poza sezonem rozrodczym samce nie są wobec siebie agresywne, a kilka samców i osobniki obu płci można trzymać razem, o ile jest wystarczająco dużo miejsca.
NATURALNY ZASIĘG	Kostaryka, Panama, Kolumbia i Ekwador.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/agalychnis-spurrelli