herpy

ŻABY

Large-webbed Bell Toad

Bombina maxima

Bombina maxima jest największym gatunkiem w rodzaju: to krępa, szarobrązowa, mocno brodawkowata żaba o długości 6-8 cm z pomarańczowym brzuchem marmurkowanym na czarno, który pokazuje, gdy czuje się zagrożona. Pochodzi z gór południowo-zachodnich Chin i potrzebuje czystej, chłodnej wody oraz chłodnego terrarium. Jest łatwa w utrzymaniu, jeśli temperatura jest niska, ale stawia większe wymagania co do jakości wody niż *Bombina orientalis*.

Rodzina: Bombinatoridae Dawna nazwa: *Bombinator maximus* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**6-8 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**6-15 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-23 °C**
Temperatura w nocy	**12-17 °C**
Wilgotność	**60-85%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 5-10 cm
UVB	**Opcjonalne**
Zimowanie	**4-8 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**20-150**
Czas do wyklucia	**3-10 dni** przy 18-22 °C
Okres larwalny	**30-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Gatunek potrzebuje akwaterrarium, w którym około dwóch trzecich powierzchni dna zajmuje woda, a jedną trzecią ląd. Dla czterech dorosłych osobników wymagane jest co najmniej 80 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	Gatunek pochodzi z chłodnych wyżyn i trzeba go trzymać w niższej temperaturze niż większość żab. W dzień odpowiednie jest 18-23 °C, a temperatura nigdy nie powinna przekraczać 25 °C. W nocy może spadać do 12-17 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-85 %. Duża część wodna załatwia większość, więc wystarczy raz dziennie lekko zraszać część lądową.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda powinna mieć 5-10 cm głębokości, a zwierzęta muszą zawsze łatwo wychodzić na ląd, np. po skośnych korzeniach, płaskich kamieniach lub roślinach. Woda ma temperaturę pomieszczenia i nie należy jej podgrzewać.
OŚWIETLENIE I UVB	Zapewnij 12 godzin światła dziennie w półroczu letnim i nieco krótsze dni zimą, sterowane wyłącznikiem czasowym. Oprawa LED o widmie światła dziennego daje wystarczająco dużo światła dla roślin.
ŻYWIENIE	Pokarm musi się ruszać. Podawaj typowe owady karmowe odpowiedniej wielkości: świerszcze, muchy, prosionki, dżdżownice i małe ślimaki. Mącznik jest tłusty i podaje się go tylko od czasu do czasu.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny w dzień i o zmierzchu i często widać go na otwartej przestrzeni, na lądzie lub unoszącego się przy powierzchni wody. Najlepiej trzymać go w grupie. W okresie rozrodu robi się gwarno, gdy samce nawołują z wody.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny.