herpy

ŻABY

Kumak górski

Bombina variegata

Bombina variegata to mała, krępa żaba o długości 3-6 cm, z szarobrązowym, pokrytym ostrymi brodawkami grzbietem oraz jaskrawożółtym i niebieskoszarym brzuchem, który pokazuje, gdy czuje się zagrożona. Gatunek zamieszkuje tereny górskie i pagórkowate Europy Środkowej i Południowej, lubi małe, nasłonecznione zbiorniki wodne, a w terrarium jest odporny, ciekawski i długowieczny. Wymaga chłodnych temperatur i chłodnego zimowania, poza tym potrzebuje niewiele miejsca.

Rodzina: Bombinatoridae Nazwa angielska: Yellow-bellied Toad **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-6 cm** długość od pyska do kloaki
Waga	**2,3-12 g**
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Temperatura w nocy	**16-20 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Część wodna** głębokość 5-10 cm
UVB	**Opcjonalne**
Zimowanie	**5-10 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**40-170**
Zniesienia w roku	**1-3**
Czas do wyklucia	**2-3 dni**
Okres larwalny	**25-70 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Szczegółowych opisów hodowli *Bombina variegata* nie ma wiele. Podane tu zalecenia opierają się na trybie życia gatunku oraz na bliskim krewnym, *Bombina orientalis*, który jest znacznie lepiej poznany w niewoli.
TEMPERATURA	Gatunek jest przystosowany do klimatu umiarkowanego i nie potrzebuje ciepła jak większość zwierząt terrariowych. W dzień odpowiednia jest temperatura 20-24 °C, a w nocy powinno być nieco chłodniej, 16-20 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-80 %. Duża część wodna utrzymuje większość wilgoci, więc zwykle wystarczy raz dziennie lekko zraszać część lądową, zwłaszcza zimą w suchym mieszkaniu.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Część wodna powinna zajmować około połowy powierzchni dna i mieć głębokość 5-10 cm.
OŚWIETLENIE I UVB	Zapewnij 12-14 godzin światła latem i do około 10 godzin zimą, sterowane wyłącznikiem czasowym. Oprawa LED daje podstawowe oświetlenie i sprzyja wzrostowi roślin. Lampa grzewcza nie jest potrzebna. UVB jest opcjonalne.
ŻYWIENIE	*B. variegata* ma duży apetyt i zjada wszystko, co żywe i dostatecznie małe, by zmieściło się w pysku: świerszcze, świerszcze bananowe, muszki owocowe, muchy, prosionki, rybiki, małe dżdżownice i małe ślimaki.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*B. variegata* jest ciekawska i towarzyska i można ją trzymać w parach lub grupach. Zwierzęta powinny być mniej więcej tej samej wielkości, ponieważ duże mogą zjadać małe, a podczas karmienia bywają nieco natarczywe.
NATURALNY ZASIĘG	Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Liechtenstein, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Ukraina, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria i Grecja.