herpy

ŻABY

Llanos Frog

Lepidobatrachus llanensis

Lepidobatrachus llanensis to szeroka, spłaszczona żaba wodna z suchego Gran Chaco w Ameryce Południowej i najbliższy krewny *Lepidobatrachus laevis*. Czatuje w płytkiej wodzie, zakopuje się i w porze suchej tworzy kokon. Gatunek jest rzadko spotykany w niewoli i prawie nic nie wiadomo o jego hodowli. Musi mieszkać pojedynczo i gryzie, więc jest to zwierzę do oglądania, a nie do brania na ręce.

Rodzina: Ceratophryidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**7-10 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Kopiący nory i półwodny**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-28 °C**
Temperatura w nocy	**20-23 °C**
Wilgotność	**60-70%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 5-20 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Liczba jaj w zniesieniu	**1 400**
Okres larwalny	**14 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli *Lepidobatrachus llanensis* wiadomo bardzo niewiele, a gatunek jest utrzymywany tylko sporadycznie.
TEMPERATURA	W dzień woda i powietrze mają 24-28 °C, a w nocy 20-23 °C. Zimna woda sprawia, że żaba niechętnie je i jest bardziej podatna na choroby, więc w większości mieszkań potrzebna jest grzałka sterowana termostatem.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 60-70 %, co duża powierzchnia wody zapewnia niemal sama.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda to dom żaby, a jej jakość jest najważniejszym elementem hodowli. Woda ma głębokość 5-20 cm, a żaba musi zawsze móc dosięgnąć zarówno powierzchni, jak i lądu bez pływania.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest potrzebne. Zwykła świetlówka włączona na 12 godzin dziennie zapewnia wyraźny rytm dobowy. W nocy musi być ciemno, bo gatunek jest prawdopodobnie najaktywniejszy wieczorem i w nocy.
ŻYWIENIE	Gatunek jest drapieżnikiem i zjada wszystko, co zdoła obezwładnić. Karmienie zapożyczono od *L. laevis*: dżdżownice, świerszcze, szarańcza, karaczany i larwy barciaka.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Lepidobatrachus llanensis* prowadzi samotniczy tryb życia i musi być trzymany pojedynczo: kijanki zjadają się nawzajem, a dorosłe żaby z tego rodzaju mogą zjadać osobniki własnego gatunku. Żaba jest zwierzęciem do oglądania i nie należy brać jej na ręce, zarówno ze względu na ugryzienia, jak i wrażliwą skórę.
NATURALNY ZASIĘG	Argentyna, Boliwia i Paragwaj.