herpy

ŻABY

Redbelly Toad

Melanophryniscus stelzneri

Melanophryniscus stelzneri to niewielka ropucha o długości 2-4 cm, pochodząca z porośniętych trawą wzgórz Argentyny. Jest czarna z żółtymi plamami na grzbiecie i czerwonym ubarwieniem na brzuchu i spodzie stóp. Prowadzi dzienny tryb życia, częściej chodzi, niż skacze, i jest odporna, o ile powietrze nie jest zbyt wilgotne. Zwierzęta dostępne w handlu to często blisko spokrewniony *Melanophryniscus klappenbachi*.

Rodzina: Bufonidae Dawna nazwa: *Phryniscus stelzneri; Atelopus stelzneri; Bufo stelzneri; Dendrophryniscus stelzneri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**2-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Sawanna i tereny skaliste**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 25 × 30 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-25 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Zimowanie	**13-16 °C** 2-3 tygodni
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**200-250**
Czas do wyklucia	**3-5 dni** przy 23 °C
Okres larwalny	**40-50 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli samego *Melanophryniscus stelzneri* wiadomo niewiele.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 20-25 °C, a w nocy może spaść do 15-20 °C. Zwykła temperatura pokojowa jest najlepszym punktem wyjścia.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza utrzymuj na poziomie 50-70 %. To najważniejszy punkt hodowli: *Melanophryniscus stelzneri* nie znosi stałej wilgotności powyżej około 70 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	W terrarium zawsze musi stać niska, szeroka miska z 1-2 cm wody. Ropuchy pływają niezgrabnie i mogą utonąć w głębszej wodzie, dlatego włóż do miski kamienie lub korek, aby łatwo mogły wyjść.
OŚWIETLENIE I UVB	Światło jest potrzebne tylko roślinom. Nic nie wskazuje, by gatunek potrzebował UVB, ale słaba świetlówka UVB dla strefy Fergusona 1 (indeks UV poniżej 1) może być korzystna.
ŻYWIENIE	*Melanophryniscus stelzneri* zjada małe żywe owady karmowe, na wolności głównie mrówki, roztocza i termity.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Ropuchy są wobec siebie pokojowe, nie są terytorialne i można je trzymać w grupach do 10 osobników. Samce nawołują, zwłaszcza gdy jest wilgotno, np. po obfitym zraszaniu.
NATURALNY ZASIĘG	Argentyna.