herpy

ŻABY

## Red-banded Rubber Frog

# *Phrynomantis bifasciatus*

*Phrynomantis bifasciatus* to krępa, gładka i lśniąca żaba z południowej i wschodniej Afryki. Jest czarna z wyraźnymi pasami w kolorze od czerwonego do kremowego, częściej chodzi, niż skacze, i najchętniej zjada mrówki oraz inne drobne stawonogi. Wydzielina skórna jest toksyczna dla innych żab, dlatego tego gatunku nie wolno trzymać razem z innymi gatunkami.

Rodzina: Microhylidae  Dawna nazwa: *Phrynomerus bifasciatus*  **Słabe toksyny skórne**

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **4-7 cm**<br>długość od pyska do kloaki |
| Długość życia | **8-10 lat** |
| Aktywność | **O zmierzchu i w nocy** |
| Tryb życia | **Naziemny** |
| Środowisko | **Sawanna** |
| Toksyny skórne | **Słabe**<br>Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 30 × 30 cm**<br>D × S × W dla 3 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **24-29 °C** |
| Temperatura w nocy | **20-23 °C** |
| Wilgotność | **50-70%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Opcjonalne** |
| Pokarm | **Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo lub w grupach** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Rozwój | **Kijanki w wodzie** |
| Miejsce składania jaj | **W wodzie** |
| Liczba jaj w zniesieniu | **300-1 500** |
| Czas do wyklucia | **4 dni** |
| Okres larwalny | **30-90 dni**<br>od wyklucia do metamorfozy |
| Pokarm larw | **Glony i rośliny** |
| Opieka nad potomstwem | **Brak** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Niewymieniony** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Wiedza na temat utrzymania *Phrynomantis bifasciatus* jest skąpa, a zalecenia opierają się na warunkach w naturalnym środowisku gatunku i nielicznych dotychczasowych doświadczeniach. |
| **TEMPERATURA** | W dzień temperatura powinna wynosić 24-29 °C, a w nocy 20-23 °C. Gatunek pochodzi z ciepłych, półsuchych terenów i najlepiej czuje się w górnej części tego zakresu. |
| **WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 50-70 %. Gatunek pochodzi z suchych i wilgotnych terenów sawannowych i lepiej znosi suszę niż większość żab, ale nadal może się przesuszyć. |
| **WODA I JAKOŚĆ WODY** | Postaw w terrarium dużą, płytką miskę z czystą wodą, na tyle dużą, by żaba mogła w niej leżeć, i na tyle płytką, by łatwo z niej wychodziła. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Nie wiadomo, by *Phrynomantis bifasciatus* potrzebował UVB, ale można zapewnić słabe UVB, które korzystnie wpływa na rośliny. Zwykłe oświetlenie terrarium przez 10-12 godzin dziennie zapewnia wyraźny rytm dobowy. |
| **ŻYWIENIE** | *Phrynomantis bifasciatus* ma mały pysk i najchętniej zjada drobne ofiary. W naturze jego dieta składa się głównie z mrówek i termitów, ale także innych drobnych stawonogów, takich jak koniki polne i pająki. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Phrynomantis bifasciatus* to spokojna żaba, która częściej chodzi i biega, niż skacze. Jest najaktywniejsza wieczorem i w nocy, a w dzień się ukrywa. Zagrożona nadyma się i pokazuje czerwone pasy. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambik, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, Namibia, Angola, Republika Południowej Afryki i Eswatini. |