herpy

ŻABY

Black-webbed Treefrog

Rhacophorus kio

Rhacophorus kio to duża, trawiastozielona żaba latająca z lasów deszczowych południowych Chin, Laosu, Tajlandii i Wietnamu. Samice osiągają do 8 cm. Błona pławna jest pomarańczowożółta z czarną plamą u nasady każdego palca dłoni i stopy, a żaba rozpościera ją podczas szybowania między drzewami. Gatunek jest nocny i płochliwy, a wiedza o jego utrzymaniu w niewoli jest skąpa.

Rodzina: Rhacophoridae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**6-8 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-24 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 2-3 cm
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W gnieździe z piany**
Liczba jaj w zniesieniu	**130-180**
Czas do wyklucia	**5 dni**
Okres larwalny	**45-85 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o utrzymaniu *Rhacophorus kio* jest skąpa.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 21-24 °C w dzień, co odpowiada zwykłej temperaturze pokojowej, a w nocy pozwól jej spaść do 18-21 °C. Krótkie okresy do 27-28 °C żaba znosi, ale temperatura nie może przekraczać 28 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-90 %, najniższa w dzień i najwyższa w nocy.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Postaw w terrarium stabilną, płytką miskę z wodą, w której żaba może siedzieć nocą. Wystarczy 2-3 cm wody, żeby żaba łatwo z niej wyszła. Wymieniaj wodę, gdy tylko się zabrudzi, najlepiej codziennie lub co drugi dzień.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaba jest nadrzewna i zaleca się słabe źródło UVB takiego typu, jakiego używa się dla tropikalnych zwierząt leśnych. Niski indeks UV na najwyższych liściach (strefa Fergusona 1) to ostrożny punkt wyjścia.
ŻYWIENIE	*Rhacophorus kio* zjada żywe owady. Świerszcze można podawać przez całe życie, od małych, świeżo wyklutych po duże, uzupełniając je małymi karaczanami, larwami muchy czarnej i od czasu do czasu larwą barciaka jako przysmakiem.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest nocny i płochliwy, a dzień spędza ukryty między liśćmi; przez większość czasu siedzi na szybie lub na wyposażeniu. Żyje raczej samotnie, ale można go trzymać w małych grupach, w których poza okresem rozrodu agresja jest niewielka.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny, Laos, Tajlandia i Wietnam.