herpy

ŻABY

Harlequin Treefrog

Rhacophorus pardalis

Rhacophorus pardalis to średniej wielkości, aktywna nocą żaba latająca z lasów deszczowych Borneo, Sumatry, Półwyspu Malajskiego i Filipin. Grzbiet jest brązowy do czerwonobrązowego z ciemnym rysunkiem w kształcie litery X, błony pławne są jaskrawopomarańczowe, a brzuch i boki żółte z pomarańczowoczerwonym siateczkowatym wzorem. Samice dorastają do 7 cm. Gatunek jest rzadko spotykany w niewoli, a wiedza o jego hodowli jest skąpa.

Rodzina: Rhacophoridae Dawna nazwa: *Rhacophorus rizali; Rhacophorus rhyssocephalus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**5-7 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-26 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 2-3 cm
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W gnieździe z piany**
Liczba jaj w zniesieniu	**100-200**
Okres larwalny	**85 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Rhacophorus pardalis* jest skąpa.
TEMPERATURA	Utrzymuj w terrarium 22-26 °C w dzień i 20-22 °C w nocy. Nie dopuszczaj do przekroczenia 28 °C i nie używaj lamp grzewczych. Kontroluj temperaturę termometrem cyfrowym i zwracaj uwagę na temperaturę w pomieszczeniu latem.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-90 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Postaw w terrarium stabilną, płytką miskę z wodą, w której żaba może siedzieć w nocy. Wystarczą 2-3 cm wody, aby żaba łatwo mogła z niej wyjść.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaba prowadzi nadrzewny tryb życia i zaleca się słabe źródło UVB takiego typu, jaki stosuje się dla zwierząt z lasów tropikalnych. Zawsze zapewnij zacienione miejsca, w które żaba może się wycofać.
ŻYWIENIE	*Rhacophorus pardalis* zjada żywe owady. Świerszcze można podawać przez całe życie, od około 3 mm dla młodych osobników do około 15 mm dla dorosłych, uzupełniając je małymi karaczanami, muszkami owocowymi dla najmniejszych młodych i od czasu do czasu larwą barciaka jako przysmakiem.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest aktywny nocą, a dzień spędza ukryty między liśćmi. Poza okresem rozrodu żyje głównie samotnie, a w porze deszczowej samce nawołują z brzegu wody.
NATURALNY ZASIĘG	Brunei, Indonezja, Malezja, Filipiny i Tajlandia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/rhacophorus-pardalis