herpy

ŻABY

Hill Garden Bug-eyed Frog

Theloderma asperum

Theloderma asperum to niewielka, nocna żaba drzewna z lasów Azji Południowo-Wschodniej. Jest czarnobrązowa z białymi brodawkami przypominającymi ptasie odchody i ma głęboko rubinowoczerwone oczy. Gatunek znosi wyższe temperatury niż pozostali przedstawiciele rodzaju i dobrze czuje się w małym, wilgotnym terrarium z częścią wodną. Odzywa się dość głośno i najlepiej trzymać go w małej grupie.

Rodzina: Rhacophoridae Dawna nazwa: *Philautus asper*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i półwodny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Temperatura w nocy	**17-21 °C**
Wilgotność	**75-95%**
Woda	**Część wodna** głębokość 5-10 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na liściach nad wodą**
Dojrzałość płciowa	**6-10 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-15**
Czas do wyklucia	**7-14 dni**
Okres larwalny	**75-180 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Theloderma asperum* jest niewielka i można ją trzymać w stosunkowo kompaktowym terrarium.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 20-24 °C, a w nocy 17-21 °C. Gatunek krótkotrwale znosi spadki do około 10 °C i bez problemu radzi sobie przy 24-25 °C, ale powyżej 27 °C robi się niebezpiecznie i może to być śmiertelne.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 75-95 %. Gatunek znosi krótkie okresy spadku do około 50 %, jeśli ma dostęp do wody, ale suche powietrze bez wody może szybko okazać się zabójcze.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Żaba dużo przebywa przy brzegu wody, a nawet siedzi pod wodą, więc część wodna nie jest ozdobą.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaba jest aktywna nocą i nie ma udokumentowanej potrzeby UVB.
ŻYWIENIE	*T. asperum* żywi się owadami. Podstawą pokarmu są małe świerszcze, uzupełniane larwami barciaka, muchami, skoczogonkami dla najmniejszych młodych, małymi karaczanami dubia i larwami muchy czarnej.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Theloderma asperum* jest aktywna nocą, a w dzień siedzi ukryta w rurkach, między roślinami lub blisko wody.
NATURALNY ZASIĘG	Malezja, Tajlandia, Mjanma (Birma), Indie, Bangladesz, Bhutan, Wietnam, Kambodża i Indonezja.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/theloderma-asperum