herpy

ŻABY

Tonkin Bug-eyed Frog

Theloderma corticale

Theloderma corticale to nocna, półwodna żaba z lasów północnego Wietnamu, Laosu i południowych Chin. Guzowata skóra w zielone i czarne plamy tak dobrze przypomina mech i porosty, że żaba niemal znika w terrarium. Potrzebuje chłodu i wilgoci i nie znosi upału, ale za to łatwo ją rozmnożyć.

Rodzina: Rhacophoridae Dawna nazwa: *Rhacophorus corticalis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**6-9 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i półwodny**
Środowisko	**Las deszczowy, las górski i tereny skaliste**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**80 × 50 × 40 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-23 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**80-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 5-10 cm
Temperatura wody	**17-22 °C**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Zimowanie	**13-16 °C** 4-22 tygodni
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na liściach nad wodą**
Dojrzałość płciowa	**8-10 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**6-47**
Czas do wyklucia	**9-22 dni**
Okres larwalny	**75-180 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Theloderma corticale* potrzebuje akwaterrarium, w którym duża część dna lub całe dno znajduje się pod wodą.
TEMPERATURA	Ciepło to największy wróg tego gatunku. W dzień powinno być 18-23 °C, a w nocy 15-20 °C. Spadki do około 10 °C nie szkodzą, natomiast wszystko powyżej 25 °C to sygnał alarmowy, a temperatury powyżej 27 °C mogą zabić żaby.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza musi być wysoka: powyżej 80 % i nigdy poniżej 60 %, inaczej żaby mogą się odwodnić. Samice składają jaja przy 80-90 %. Duża powierzchnia wody sama utrzymuje wilgotność, więc żab nie trzeba często zraszać.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Część wodna to dom tego gatunku. Woda powinna mieć 5-10 cm głębokości, głębsza też się sprawdzi. Żaby muszą móc siedzieć w wodzie i łatwo wychodzić na korek lub korzenie.
OŚWIETLENIE I UVB	Żaba prowadzi nocny tryb życia i nie ma udokumentowanej potrzeby UVB.
ŻYWIENIE	*T. corticale* je owady: dobrze odkarmione świerszcze, karaczany dubia, larwy barciaka, larwy muchy Hermetia i małe larwy zawisaków.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Theloderma corticale* jest spokojna i w dzień kryje się w rurkach, jaskiniach i między roślinami. Kilka minut po zgaszeniu światła staje się aktywna.
NATURALNY ZASIĘG	Wietnam, Laos i Chiny.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/theloderma-corticale