herpy

ŻABY

Amazon Milk Frog

Trachycephalus resinifictrix

Trachycephalus resinifictrix to duża, krępa, nocna żaba drzewna z koron drzew Amazonii. Młode mają czarno-białe pasy, dorosłe są marmurkowe, a zaniepokojona żaba wydziela mlecznobiałą wydzielinę skórną. Rozmnaża się w wypełnionych wodą dziuplach, jest odporna w hodowli i pod wieloma względami przypomina *Ranoidea caerulea*.

Rodzina: Hylidae Dawna nazwa: *Phrynohyas resinifictrix* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**6-10 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**8-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**75 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**21-29 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**50-100%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**12-18 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**100-1 500**
Czas do wyklucia	**1-2 dni**
Okres larwalny	**21-75 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosła para potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 75 × 30 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość), co wystarcza dla maksymalnie czterech dorosłych osobników. Grupa pięciu zwierząt potrzebuje co najmniej 60 × 45 × 60 cm.
TEMPERATURA	*Trachycephalus resinifictrix* toleruje szeroki zakres temperatur.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza jest mniej krytyczna niż temperatura, ale terrarium trzeba zraszać co najmniej raz dziennie. Używaj odchlorowanej wody z kranu lub wody z odwróconej osmozy, która nie zostawia też osadu wapiennego na szybie.
WODA I JAKOŚĆ WODY	*Trachycephalus resinifictrix* potrzebuje dużej misy z czystą wodą, odpowiadającej dziupli w naturze.
OŚWIETLENIE I UVB	*Trachycephalus resinifictrix* jest aktywny nocą i może zarówno żyć, jak i rozmnażać się bez UVB, ale młode dorastające z UVB rosną większe i mają zdrowszy szkielet niż młode bez niego. Dlatego zaleca się słabe oświetlenie UVB.
ŻYWIENIE	*T. resinifictrix* jest żarłoczny i rzadko wybredny. Świerszcze mogą stanowić większość diety i powinny mieć mniej więcej taką długość, jak szeroka jest głowa żaby.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*T. resinifictrix* nie jest zwierzęciem do brania na ręce. Skóra jest przepuszczalna i wrażliwa na tłuszcze i sole z ludzkiej skóry, a wydzielina skórna może podrażniać.
NATURALNY ZASIĘG	Brazylia, Gujana Francuska, Surinam, Gujana, Wenezuela, Kolumbia, Peru i Ekwador.