herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

żółw pustynny

Centrochelys sulcata

Centrochelys sulcata to największy żółw lądowy kontynentalnej Afryki: pancerz osiąga 50-85 cm, masa do 90 kg, a zwierzę może żyć 50-80 lat. Młode są małe, ale szybko rosną, a dorosłe osobniki wymagają zimą ogrzewanego pomieszczenia o powierzchni ponad 20 m², latem dużego wybiegu na zewnątrz i opiekuna, który udźwignie to zadanie przez dziesięciolecia.

Rodzina: Testudinidae Nazwa angielska: African Spurred Tortoise Dawna nazwa: *Geochelone sulcata; Testudo sulcata*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**50-85 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**30 000-90 000 g**
Długość życia	**50-80 lat**
Aktywność	**Za dnia i o zmierzchu**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**640 × 320 × 120 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-41 °C**
Temperatura w nocy	**21-23 °C**
Wilgotność	**40-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 4
Pokarm	**Rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**120-180 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**15-40 jaj**
Zniesienia w roku	**2-3**
Inkubacja	**90-120 dni** przy 30-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Miejsce to pierwsza sprawa do wyjaśnienia. Rozpowszechniona zasada minimalna dla żółwi lądowych to długość równa 8-krotności i szerokość równa 4-krotności długości pancerza największego osobnika.

TEMPERATURA

Temperatura powietrza powinna wynosić 24-32 °C w dzień, z miejscem do wygrzewania o temperaturze 38-41 °C dla młodych osobników, oraz 21-23 °C w nocy.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Choć gatunek pochodzi z suchego obszaru, młodych osobników nie wolno trzymać zupełnie na sucho: w naturze młode wykluwają się w porze deszczowej i spędzają dużo czasu w wilgotnych norach.

WODA I JAKOŚĆ WODY

Zawsze musi stać duża, płaska i stabilna miska ze świeżą wodą, wkopana tak, żeby zwierzę mogło do niej wchodzić i z niej wychodzić.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny w dzień i w pomieszczeniu przez cały rok potrzebuje zarówno mocnego światła, jak i UVB (strefa Fergusona 4), z indeksem UV około 4-6 w miejscu do wygrzewania.

ŻYWIENIE

C. sulcata jest roślinożercą i potrzebuje diety bogatej w błonnik i ubogiej w białko.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek jest spokojny i powolny, ale nie jest zwierzęciem do brania na ręce. Podnoszenie go stresuje, a dorosłego osobnika ważącego 50-90 kg jedna osoba nie podniesie.

NATURALNY ZASIĘG

Etiopia, Erytrea, Sudan, Sudan Południowy, Czad, Niger, Mali, Mauretania, Senegal, Republika Środkowoafrykańska i Kamerun.