herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Żółw węglowy

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis carbonarius to średniej wielkości, ciemny żółw lądowy z sawann i skrajów lasów Ameryki Południowej, z czerwonymi lub pomarańczowymi łuskami na głowie i kończynach. Pancerz osiąga zwykle 30-35 cm długości, zwierzę żyje co najmniej 50 lat i jest jednym z najczęściej utrzymywanych tropikalnych żółwi lądowych. Przez cały rok potrzebuje wysokiej wilgotności i ciepła, a zjada zarówno rośliny, owoce, jak i niewielkie ilości pokarmu zwierzęcego.

Rodzina: Testudinidae Nazwa angielska: Red-Footed Tortoise Dawna nazwa: *Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria; Testudo carbonaria*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-45 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**50-70 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Sawanna, suchy las i las deszczowy**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**280 × 140 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**32-35 °C**
Temperatura w nocy	**20-23 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**2-7 jaj**
Inkubacja	**105-200 dni** przy 28-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Niepoddany ocenie (NE)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Chelonoidis carbonarius* to aktywny żółw, który wykorzysta każdą przestrzeń, jaką dostanie. Żyje na ziemi, więc powierzchnia dna jest ważniejsza niż wysokość.
TEMPERATURA	W pomieszczeniu musi występować gradient. Temperatura powietrza w dzień wynosi 24-29 °C, a miejsce do wygrzewania pod lampą grzewczą ma 32-35 °C, mierzone na samym podłożu.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Gatunek pochodzi z ciepłego i wilgotnego klimatu i potrzebuje wysokiej wilgotności powietrza: 70-90 %, z krótkimi skokami do 100 %.
OŚWIETLENIE I UVB	*C. carbonarius* jest aktywny w dzień i potrzebuje UVB, gdy nie przebywa w bezpośrednim słońcu. Celuj w indeks UV 2,0-3,0 w miejscu do wygrzewania (strefa Fergusona 2).
ŻYWIENIE	*C. carbonarius* jest wszystkożerny i w naturze zjada rośliny, kwiaty, owoce, grzyby i niewielkie ilości pokarmu zwierzęcego. W niewoli sprawdza się proporcja około 90 % materiału roślinnego i 10 % pokarmu zwierzęcego.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest ciekawski, aktywny i stosunkowo spokojny. Uczy się rozpoznawać swojego opiekuna, chętnie podchodzi, gdy jest jedzenie, i bierze pokarm z ręki lub pęsety.
NATURALNY ZASIĘG	Panama, Kolumbia, Wenezuela, Gujana, Surinam, Gujana Francuska, Brazylia, Peru, Boliwia, Paragwaj, Argentyna i Trynidad i Tobago.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zolwie/chelonoidis-carbonarius